

Fugler i Hordaland 1997

Av Frode Falkenberg

Nytt rapportformat

Fra denne rapporten av, vil de respektive års LRSK og "Hordalandsrapporter" bli publisert i ett. Dette er vedtatt av LRSK for å få en oversiktlig samlerappport med alle observasjoner dette året. Årlige lokalitetsrapporter, som oppsummerer alle arter, vil likevel være å finne i Krompen fremover.

Året 1997

Et begivenhetsrikt år på mange fronter. En ny art for fylket er godkjent av komitéen; stripegås. Da arten er innført til Europa, men forvillede fugler hekker, plasseres funnet i kategori C (Mjøse og Heggland, in press, VF 2/99). Vi er med denne oppe i 305 registrerte arter i Hordaland. Vi har ikke fått tilbakemelding fra NSKF på en stund, da de lider under særdeles stort arbeidspress for tiden. Dette har gjort at artene som skal godkjennes, ennå ikke er ferdigbehandlet. Til tross for dette har vi inkludert noen observasjoner i denne rapporten for å få et mer fullstendig bilde av fugleåret. Dette gjelder følgende arter: aftenfalk, svartehavsmåke, sibirpiplerke (2), gulirisk og sibirspurv. Alle disse observasjonene er foto eller videodokumentert.

Andre bemerkelsesverdige ting dette året inkluderer bl.a. en sterk forekomst av den grønlandske underarten av steinskvett, *leucorhoa*, denne våren på Turøy, og antall observasjoner av rosenfink. Ellers er det observert sjeldne fugler som vepsevåk, vaktel, dvergmåke (2), myrsanger, dvergfluesnapper, hortulan og vierspurv i år. Alle artene med under 10 registreringer i Hordaland.

LRSK behandlet 74 saker, hvorav 67 var fra inneværende år. 11 saker er oversendt NSKF. 59 saker er godkjent av LRSK, to underkjent og to er satt på avventing. Komitéen bestod i 1997 av Frode Falkenberg, Per Øyvind Grimsby, Frank H. Pedersen (sekretær) og Trygve Serck-Hanssen.

Oppfordring til observatørene

Denne rapporten vil være en pekepinn på hva som ønskes av observatørene mht. rapportering. Alle større tall, uvanlige lokaliteter eller årstider, og sære observasjoner ønskes. Det vil selvsagt være opp til enhver å avgjøre hva som er interessant, men send heller inn for mange, enn for få observasjoner. Er du usikker på om en obs. bør sendes inn, send den inn likevel. Vi plukker ut

hva som er verdig publisering. Husk å skille mellom observasjoner som skal beskrives, og de som bare skal rapporteres. Vær også vennlig å føre opp kommunenavnet på lokalitetene. De nye fuglelistene er å finne i Krompen nr.4 1998. Her ser du hvilke arter som skal beskrives og rapporteres. De nye listene er noe endret. Den østlige underarten av turndragås, *albifrons* og knoppsvane er fjernet, og trenger ikke lenger å beskrives. Den vestlige underarten av tundraås, *flavirostris*, som tidligere ble behandlet av NSKF, er kommet inn, og må nå beskrives for behandling av LRSK. Observasjoner som skal behandles av komitéen, må være vedlagt dokumentasjon. Vær nøye med beskrivelsene, og før opp alle observatører. Da årsrapportene skal publiseres i Krompen nr. 2 hvert år, er det viktig at alle sender inn sine observasjoner til fristen; 1 februar. De som ikke har gjort dette for 1998 må gjøre det snarest. Rapporten kommer i neste nummer av Krompen.

Bakerst i denne rapporten finner dere observatørlisten for 1997. Ikke overbevisende mange personer her. Vi vet at det finnes flere der ute som kikker jevnlig på fugl, så dette blir en oppfordring til dere; send inn det dere har av notater, vær så snill. Om dere ikke rapporterer inn, vil heller ikke bildet vi danner oss av fugl i fylket bli fullstendig.

Forkortelser i rapporten

*	-Observasjonen er godkjent av LRSK
(F,V)	-Observasjon foto eller videodokumentert
Ad.	-Fuglens voksne/utfaragete fjærdrakt (adult)
Juv.	-Fuglens første fjærdrakt (juvenile)
Pull.	-Reirunge, eller ikke flygedyktig fugl (pullus)
M	-Hann
F	-Hunn
FF	-Hunnfarget individ
1K, 1K+, 2K+ etc.	-Angir alder etter kalenderårsystemet
N,S	-Trekkretning nord eller sør
Sy.	-Syngende individ
Rm.	-Ringmerket
S.st.	-Samme sted
Be.	-Bergen kommune
Øyg.	-Øygarden kommune
As.	-Askøy kommune

For å spare inn plass er følgende lokaliteter ikke påført kommunenavn: Skogsøy i Øygarden, Turøy i Fjell, og Herdla i Askøy kommune. En del av observasjonene fra Herdla er gjengitt uten observatører, da de er hentet fra Herdlarapporten 1997.

Artsoppsummering 1997:

Smålom *Gavia stellata* Alle innrapporterte obs: 1 ind. Gjerdevik, Fusa 25/1 (NOF). Ad. i sommerdrakt Kalandsvann, Be. 3/4 (MHE,ATM). 21 ind. på nordtrekk Turøy i perioden 9-18/5 (TFS). 4 Skogsøy 20/9, 3 21/9 og 1 12/10 (ATM,MFR,BOH). 120 ind. på sørtrekk Skogsøy 4/10 (ATM m.fl.). 1 ind. Eldøy, Stord 15/11 (THH,ØBI). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 23/11 (MFR,ATM).

Storlom *Gavia arctica* 1 ad. Kalandsvann, Be. 28/04 (MHE,ATM,Bill Stanton). 1 Sandvin 9/5 (RVO). 1 ad. Eidfjordvatnet, Eidfjord 22-23/5 (FFA). 1 Herdla 23/9 og 1 5-11/11. Hvor mange storlommer finnes egentlig i Hordaland? Hovedtrekket foregår ikke langs Norskekysten, men lenger øst, bl.a. opp Østersjøen. Dette gjør sitt til at arten er fåtallig hos oss under trekket. Alle observasjoner bør sendes inn til LRSK.

Islom *Gavia immer* 1 trekkende mot sør Skogsøy 21/9 (ATM,MFR). 3 ad. mot nord forbi Skogsøy 4/10 (ATM m.fl.). 1 1K mot S, og 2 ad. mot N Skogsøy, 12/10 (OMO,MFR m.fl.). 1 Sele, Øyg. 30/12 (MFR). Fra Herdla har vi følgende obs; 2 1/1, 1 10/1-1/2, 1 15/3-6/4, og 1 ind. på flg. datoer om høsten: 25/10, 9/11, 14/11 og 20/12. Typisk tendens for observasjoner i fylket, et fåtall på høsttrekk og overvintrende individer.

Gulnebbloom *Gavia adamsii* Alle obs. på vårtrekk nordover forbi Skogsøy: 2 ind. 26/4 (THA,EFR,EHA,OMO), og 3 ind. 31/5 (THA,EFR,EHA,FHP,OMO).

Is-/Gulnebbloom *Gavia immer/adamsii* 1 ind. N Turøy 8/5, og 1 ind. S medio oktober (TFS). 2 ind. på sørtrekk Skogsøy 12/10 (OMO,MFR m.fl.).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis* 1 Hamretjern, Be. 1/1-25/1 (FFA,MHA,ATM, THA m.fl.) og på høsten 1-30/11 (THA,NOF). 1 ind. i s.dr. Klokkarvann, Be. 3/4 (ATM,MHE). 1 Kalandsvann, Be. 30/11-5/12 (NOF). 1 ind. Hamreelven, Be. 17. og 20/11 (ATM, OOV), og 1 Sulen, Fedje 24/11 (ATM,FFA,MFR). 1 Måge, Ullensvang nov. (JFØ). 1 Ystanes, Ullensvang 4/12 (KG), og 1 Grimo, Ullensvang 17/12 (JFØ). Dvergdykkeren er en relativt kryptisk art som ikke er lett å observere. Ni obs. et år er derfor tilfredsstillende. Trolig ligger det spredte ind. på egnete lokaliteter langs hele Hordalandskysten vinterstid.

Toppdykker *Podiceps cristatus* 1 ind. Herdla 14/1* (Geir Nordanger,ECH). Fortsatt en uvanlig fugl i fylket. Få egne furasjeringsplasser er trolig årsaken til dette. Dette var funn nr. 27 i Hordaland.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena* 2 Turøy 7/11 (TFS). 1 Kyvik, Stord 31/12 (THH, ØBI). Beste tall fra Herdla, 5 ind. 6/4, og 5-6 14/11. Flere obs. av fem individer på en lokalitet i dette fylket er absolutt ikke verst.

Havhest *Fulmarus glacialis* 104 ind. Skogsøy 28/3 (ATM,FFA,KES,MFR), er et høyt tall så tidlig om våren. 139 ind s.st. 4/10 (ATM,EFR,MFR). Denne dagen ble det også observert et ind. av den mørke fasen. Dette er første obs. av en slik fugl på Skogsøy. Mørke havhester finnes stort sett i høyarktiske farvann, og er uvanlige langs norskekysten.

Grålire *Puffinus griseus* 3 Skogsøy, 8/9* (ATM,BOH,FFA,KMJ). 4 Skogsøy 21/9* (MFR,ATM). Under riktige værforhold med vestavind, dukker grålirene opp på kysten om høsten. Fuglekikkernes aktivitet i slike perioder er nok den begrensende faktoren for funnmengden.

Havlire *Puffinus puffinus* 2 Skogsøy 8/9* (FFA,BOH,ATM). Samme dag ble det også sett tre grålirer. Været var til dels hardt, med vestavind og byger.

Havsvale *Hydrobates pelagicus* 73 ind. rm. + 2 britiske og 10 norske kontr. Turøy i perioden 24/7-1/9 (TFS).

Havsule *Sula bassana* Høyeste tall innrapportert i år er 281 ind. fra Skogsøy 28/3 (ATM,FFA,KES,MFR).

Knoppsvane *Cygnus olor* 1 ad. Eidfjordvatnet, Eidfjord i januar*(F) (Hardanger Folkeblad) 1 ad. Sandvin, Odda 27/2-8/3*(F) (RVO m.fl.). 1 Ådlandsvatnet, Stord 17/4-8/6* (THH,RGL, M.Gloppen). 1 ad. Ulvenvatnet, Os 26/10-20/11* (ATM,OOV m.fl.). Vi er oppe i 28 funn av arten i fylket, med en økende tendens de siste åra. Knoppsvanen er ikke lenger nødvendig å beskrive for LRSK, men fortsatt for all del å sende inn observasjonene.

Sangsvane *Cygnus cygnus* 32 ad. og 2 2K Kalandsvann, Be. 3/4 (MHE,ATM). 47 ad. og 5 juv. Kalandsvann, Be. 5/12 (MHA,ATM m.fl.). Alle tosfirete tall bør sendes inn til LRSK, slik at vi kan få et bedre bilde av overvintringsbestanden i fylket.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus* Fra Herdla har vi følgende observasjoner; 1 19/1-28/3. 1 26/10, 1/11, 3 8/11, og 1 22-23/11. Kortnebbgjessene trekker ikke langs kysten av Vest-Norge, men lenger inn i landet, derfor uteblir de store tallen Overvintring hos oss er uvanlig.

Tundragås *Anser albifrons* 16 Herdla 22-23/11*, og 1 ind. s.st. 30/11 og 7/12 (DHG,FHP,OMO,EHA,THA). 3 ad. og 6 1K-fugler (albifrons) Stormark, Fedje 23-24/11*(F,V) (BOH,ATM,FFA,MFR m.fl.). 1 ad. Tjeldstømarka, Øyg. 23/11* (ATM,MFR).

12 ind. (albifrons) Høyland, Stord 23/11*, og 2 ind. s.st. 12/12 (THH m.fl.). 6 (albifrons) Stend, Be. 2/12* (MFR). 1 Hopsvatnet, Lindås 13/12* (EFR). En typisk opptreden av tundragås hos oss; høst og vinter. Underarten albifrons, som hekker i Sibir, er tatt ut av LRSK listen, men den grønlandske underarten (*A.a.flavirostris*) skal fremdeles beskrives.

Grågås *Anser anser* Overvintring Herdla, max. 62 ind. 26-27/2 (EFR,OMO), som trolig er den største vinterflokken i fylket noensinne.

Stripegås *Anser indicus* 1 ind. Herdla 16/8* (THA,EHA,DHG). Dette er første funn i fylket. En ventet art, som trolig ikke er spontan. Stripegåsa er innført til Europa, men flere forvillede fugler hekker, og funnet plasseres derfor i kategori C (se innledning).

Kanadagås *Branta canadensis* Opptil 15 overvintrende på Herdla, og max. 24 ind. i løpet av høsten. Alle konsentrasjoner av arten bør rapporteres, for å gi oss en bedre oversikt over forekomsten i fylket.

Hvitkinngås *Branta leucopsis* 17 ind. N Turøy 8/5 (FFA). 2 Bruvik, Osterøy 8/6 (utradsisjonell lokalitet) (TBR). 110 ind. S Skogsøy 21/9 (ATM,MFR). 60 ind. på Fedje 5/10 (BOH). 29 ind. 28/9, 7 4-5/10, 1 11/10-8/11, og 1 20-22/12 på Herdla.

Ringgås *Branta bernicla* 11 Skogsøy 31/5 (EFR,THA,OMO m.fl.). 1 Herdla 22-30/11 (OMO m.fl.). Skogsøyfunnet er i beste trekktid for de vestlige (hrota) ringgjessene, som passerer norskekysten. Herdlafuglen viste karakterer til den østlige underarten *bernicla*, som skal godkjennes av LRSK. Dette funnet er ikke innsendt, men fuglen er avbildet i Krompen 3/98, og tas med her. Dette blir i så fall 3. funn av denne underarten i fylket.

Brunnakke *Anas penelope* Alle vinterfunn: 1-5 Tveitevannet, Be. 1/1-13/4 (OMO). 1M Sævarhasvikjo, Stord 22/2 (THH). 11 Ortuvannet, Be. 30/11 (NOF), og 3M + 4F 5/12 (MHA,ATM m.fl.). 4 Kalandsvann, Be 30/11 (NOF). 3 Ulvenvann, Os 30/11 (NOF). 1M+6F 6/12 (OMO), og 1M + 4F 28/12 (ATM) Tveitevannet, Be. Hekkefunn: 1F m/2 pull Sveio 14/8 (RVO).

Snadderand *Anas strepera* 1M Reppen, Voss 4/5-medio juni* (ECH,THA,EHA,OMO). De aller fleste funnene av snadderand stammer fra indre deler av fylket, og om våren, som også denne. Dette var funn nr. 17 i Hordaland.

Krikkand *Anas crecca* Vinterfunn: 1 Rotavannet, Øyg. 30/12 (FHP,MFR,OMO). 1F Ortuvannet, Be. 10/12 (MFR) og 1 par Liavatn, Be. 21-31/12 (EFR).

Stjertand *Anas acuta* 1M Ortuvannet, Be. 1/1-3/4, og fra 19/10 og ut året (fl.obs.). Hhv. 2. og 3. overvintring for denne fuglen. Arten viser seg å være mystisk fåtallig i Hordaland.

Rødhodeand *Netta rufina* 1. funn i fylket: 1F Rotatjodno v/Bremnes i Bømlo 17-23/9 (V) (Peter Mallinson,BOH m.fl.). En asiatisk art, men også en del hekkende par på det europeiske kontinentet. Arten er ikke uvanlig som parkfugl, så vi får avvente å se hvilken kategori denne havner i. Innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF. Ni funn i Norge fram til 1995.

Taffeland *Aythya ferina* 1F Lyngbøvann, Be. 5-6/10 (MFR). 2F Storavatnet, Stord 28/12 (THH,ØBI).

Toppand *Aythya fuligula* Hekkefunn: 1F m/6 pull. Skjenavann, Be. våren (THA,EHA). 2F m. hhv. 7 og 8 pull. Kalandsvann, Be. 29/7 (OMO), og 1F m/3 pull. v/Sartor senter, Fjell ultimo juli (ATM,FFA). Alle hekkefunn, og konsentrasjoner på over 100 ind. bør innrapporteres.

Bergand *Aythya marila* 1FF Byparken, Be. 11/1 (OMO). 1 ind. Byparken, Be. 17-19/10 (ATM). 1 ind. Store Lungegårdsvann 8/11 (ATM,FFA). Alle bergender bør rapporteres til LRSK.

Praktærfugl *Somateria spectabilis* 1 ad.M Herdla 1/1-19/1 og 28/7-31/12 (fl.obs.). Vår alles trofaste hann holder fortsatt stand, denne gang i sin 12. (!) vinter. Dette er også en art som skal godkjennes av LRSK. Men dette ind. trenger man ikke å beskrive. Alle obs.datoer er likevel ønskelig.

Havelle *Clangula hyemalis* Uvanlig lokalitet: 1 ind. Store Lungegårdsvann, Be. 8/2 (ATM), og trolig samme fugl i Byparken, Be. 24/3-2/4 (ATM,FFA).

Svartand *Melanitta nigra* Observasjoner fra indre strøk: 7 ind. Simadalen, Eidfjord 23/5 (FFA). 1 ind. Austrepollen, Mauranger, Kvinnherad 18/9 (Torbjørn Ergon,ATM). 2 Jåstad, Ullensvang 15/12 (KG).

Kvinand *Bucephala clangula* Høy konsentrasjon: 350 ind. Ljones, Kvam 30/12 (Jostein Moldsvor).

Lappfiskand *Mergus albellus* Alle obs: 1FF Hamretjern, Be. 20/1-25/1 (ATM,FFA, KES,MHA,MFR m.fl.). 1 FF Store Nesttunvann, Be. 30/1-25/2 (OMO,NOF). 1FF Kalandsvann, Be. 30/1-25/2 (OMO,NOF), og 30/11 (NOF) 2FF 5/12 -25/12 (EFR,MHA, ATM,OMO m.fl.). Noen få ind. overvintrer hvert år i fylket. Flest overvintrende lappfiskender i Norge finner vi i Rogaland.

Vepsevåk *Pernis apivorus* 1 Nordås, Be. 15/7* (Audun Amundsen). 3. Funn av denne mer sørøstlige arten i Hordaland. Forrige obs. var et ind. 11/10-80 på Voss. Dette er det første sikre funnet i Bergen.

Hønehauk *Accipiter gentilis* Et meget dårlig år for hønehaukene på Bergenshalvøya, Bg. og Os. Kun 3 par gikk til hekking, og det ble bare produsert 8 unger. 1 1996 gikk 5 par til hekking, og ungeproduksjonen var på hele 18 ind. (OOV).

Kongeørn *Aquila chrysaetos* 1 Indre Hamre, Be. 26/1 (MFR). 1 ad. Kaldestad, Eksingedalen, Vaksdal 9/6 (ATM,OOV). Ad. Lavik, Eksingedalen, Vaksdal 18/6 (ATM,OOV), og 1 på Stend, Be. 31/12 (THA). Få obs. av arten, rapporter alle!

Fiskeørn *Pandion haliaetus* Eneste obs. er 1 ind. Skånevik, Etne 27/4 (RVO).

Tårnfalk *Falco tinnunculus* Vinterfunn: 1 Stord kyrkje, Stord 18/1 (THH).

Aftenfalk *Falco vespertinus* 4. funn i Hordaland: 1 1K Ulvenvannet, Os 6-21/9 (F,V) (Ingvar Grastveit, Stein Byrkjedal m.fl.). Fuglen var meget tillitsfull, og gikk ofte ned på bakken for å søke føde. Den ble etter hvert vurdert til å være i meget dårlig kondisjon, og innfanget 21/9. Falken døde i fangenskap på skadestasjonen på Digranes 24/9. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF. Bilder er publisert bl.a. i Vår Fuglefauna. Aftenfalken hekker i Øst-Europa, og det er i overkant av 70 funn i Norge pr. 1995. Som majoriteten av de norske, er alle Hordalands-funnene om høsten (2K M 19/9 1887 Melingen, Be., ad.M 12/8-87 Fedje, og 1K 18/9-88 Lindås).

Jaktfalk *Falco rusticolus* Hekking: 1 par fikk fram 3 unger på Osterøy (TBR pers. med.). Ellers alle obs: 1 1/5 og 2/11 på Herdla. 1K Tinnhølen, Eidfjord 4/9 (TLI,ATM).

Vandrefalk *Falco peregrinus* Alle obs: 1 Skolten, Be. 26/2 (MFR). 1 ind. Skogsøy 28/3 (FFA,MFR,ATM,KES). 1 Ulriken, Be. 24/8 (EFR). 1 Turøy 31/8 og 1 1K F s.st. 16/10 (TFS). 1 6/9 (MFR,EFR,KES), og 1 1K og 1 ad. Skogsøy 21/9 (ATM,MFR) Fra Herdla; enkeltind. 29/3, 30/8, 10/9 og 21/9. 1 1K Vestbøstad, Fitjar 17/9 (THH,Magne Klementsén).

Vaktel *Coturnix coturnix* 1 spillende Sævarhagen, Stord 23/5-6/6* (THH m.fl.). 1 spillende Flesland, Be. 3-21/6* (THA,EHA,OMO,Ragnar Vikøren m.fl.). Dette er 3. Og 4. Funn i Hordaland. De to tidligere er et ind. på Voss før krigen, og et ind. i Dyrvedalen på Voss 2-5/6 1995. Det var rykter om flere obs. hos oss, men innrapporteringen av disse har ikke kommet oss i hende. Dette året var et meget bra år for vaktelen også ellers i Norge, med uvanlig høye tettheter bl.a. på Jæren.

Vannrikse *Rallus aquaticus* Enkeltind. obs. på Turøy i per. 25/9-27/10 (TFS). 1 Kristianborgvann, Be. 7/12 (EFR). Et relativt dårlig år for overvintrende vannrikser i fylket.

Myrrrikse *Porzana porzana* 1 spillende Rimbareidtjødno, Stord 18/5* (THH,ØBI). Dette er det 14. funnet siden 1975, og hele fem observasjoner ble gjort i 1996.

Åkerrikse *Crex crex* 1 spillende Husebø, Meland 10-20/6*(V), så et par dager v/Skjeljanger (OMO,EFR,T. & E. Karlsen,J. Isdal m.fl.). Kun en åkerrikseobservasjon er urovekkende.

Sivhøne *Gallinula chloropus* 1 Ortuvannet, Be. 1/1-16/3 og 1 ad. 19/10-ut året. (MFR,ATM m.fl.). 1 1K Storavatnet, Stord 28/12 (THH,ØBI). Hele 6 ind. sett sammen på båthavnen innerst i Store Lungegårdsvann, Be. 8/11 (FFA,ATM), er trolig høyeste konsentrasjon av denne arten på nittitallet. Kun 3 ind. og 1 død igjen s.st. 12/12 (FFA,ATM) og 1 29/12 (OMO).

Sothøne *Fulica atra* Hekkefunn: 1-19/5 reir med 4 egg under ruging, og 28/6 var det 3 ad. m/4 store pull i Skjenavann, Be. (EHA,THA). Dette er trolig rundt det 10. hekkefunnet i fylket. Ellers alle obs; 3 Nygårdsbrua/St.Lungeg.v. Be. 1/1-8/2 (ATM,FFA,OMO), og 2 25/3 (ATM). 1 Hamreelva 4/1 (OMO). 1 Leirvik, Stord 7-22/2 (THH,RGL). 2 Kirkebukten, Be. 9 og 23/2 (MFR). 1 Tveitevann 8/3 (OMO). 2 ind. St. Lung.v., Be. fra 8/11 (FFA,ATM) og 3 28-29/12 (ATM,OMO). 1 Liavatn, Be. 28/9-6/12 (EFR). 1 ind. Ulvenvannet, Os 18/11 (ATM,OOV). 1 Klokkevatn, Be. 30/11 (NOF).

Tjeld *Haematopus ostalegus* Sein høstobs; 1 ind. Fedje 24/11 (FFA,ATM,MFR).

Boltit *Charadrius morinellus* Trekkobservasjoner om våren er ikke vanlig av denne arten, 6 ind. 1/5 (EHA,ENA,OMO,THA), og 2 ind. 24/5 (EHA,THA) på Herdla er eneste innrapporterte obs. Mer sikkert er den å treffe nær hekkeområdene, som 1 ind. Dyranut, Eidfjord 21/5 (FFA).

Tundralo *Pluvialis squatarola* Vinterfunn: 1 ind. 25/10-26/12 på Herdla (EHA,THA,OMO). En meget sjelden vintergjest hos oss, men overvintring har funnet sted på Herdla også tidligere.

Vipe *Vanellus vanellus* Minst 15 par hekket på Stend, Be. Primo mai (Kenneth Myrvold).

Fjæreplytt *Calidris maritima* 40 Angeltveit, Fjell 5/1 (MFR,ATM,FFA).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus* Vårobservasjoner er ikke vanlig; 1 ind. Kalandsneset, Be. 9/5 (OMO). Desto mer tallrik om høsten: 4 ind. Herdla 4/10, enkeltind.

spora disk s.st. 27/9-22/11. 1 Fedje 15/10 (KMJ). 2 ind. Klokkarvatnet, Be. 20/11 (ATM,OOV). 1 ind. Ulvenvannet, Os 20/11 (ATM,OOV). Vinter: 1 ind. Stend, Be. 31/12 (THA).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media* 2 spillende ind. Liset, Eidfjord 20-23/5 (FFA,Lars E. Johannessen), som trolig ventet på at snøen skulle forsvinne lenger inne på vidda. 1 Bjoreidalen, Eidfjord 21/7 (EHA,OMO,THA). 1 ind. Tinnhølen, Eidfjord 2. og 4/9 (TLI, ATM). Bjoreidalsområdet er den mest sikre lokaliteten for arten i fylket.

Rugde *Scolopax rusticola* Vinterfunn: 1 Rydland, Fitjar 7/12 (THH,RGL). 1 Turøy 30/12 (OMO,MFR).

Svarthalespove *Limosa limosa* 1 Herdla 5/9* (Julian Bell). 1 1K (islandica) Herdlevær, Øyg. 6/9* (BOH,KMJ). Sistnevnte er andre funn av denne underarten hos oss. Disse hekker bl.a. i Nord-Norge og på Island. Av utseende er islandica rødere i vår og ungfugl drakt, og har kortere nebb. Totalt 23 funn av svarthalespove i Hordaland nå.

Storspove *Numenius arquata* Vinterfunn: 1 Hoplandsjøen, Austrheim 13/12 (EFR).

Gluttsnipe *Tringa nebularia* Ikke spesielt vanlig på vårtrekk i kyststrøk; 1 ind. 18/5 og 3 19/5 Turøy (TFS). Ellers: 5-6 ind. Herdla 28/8. 17 ind. 10/8-1/9 Turøy (TFS). 5 29/8 Sævarhasvikjo, Stord (THH,ØBI,RGL).

Skogsnipe *Tringa ochropus* 1 ind. Herdla 1/6 (OWJ), og 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 22/8 (THH,ØBI). Under havsvalefangst ble det observert 11 ind. i perioden 1/8-28/8 nattetid på Turøy (TFS). 2 Osevatn, Be. 16/8 (EFR).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos* 156 ind. obs. på Turøy i per. 24/7-26/9. Trekktoppen var overgangen juli/avg., med 18 ind. 1/8 som beste tall. Et sent ind. obs. s.st. 9/10 (TFS). Majoriteten av disse ble observert trekkende om natten.

Polarjo *Stercorarius pomarinus* 1 ad. trakk nord forbi Skogsøy 4/10 (ATM,EFR,MFR).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus* 2 ad. trekkende mot nord, Skogsøy 4/10 (ATM,EFR, MFR). Dette er en sen observasjon av denne arten, der hovedmengden drar sørover i avg/sept.

Storjo *Stercorarius skua* Alle obs; 1 Skogsøy 31/5 (EFR,EHA,FHP,OMO,THA). 3 N Turøy 26/8 (ATM,FFA). 3 S Skogsøy 6/9 (EFR,KES,MFR), 1 S Skogsøy 20/9 (ATM,BOH,MFR), og nok et ind. N 21/9 (ATM,MFR).

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* 1 ind. i 1.vinterdrakt ble oppdaget i Byparken, Be. 21/11 (F) (ATM,FFA,Geir Richard Kallestad og Jo Hafsmo), og ble sett ut året. 5/12 var den også innom Ortuvatnet i Fyllingsdalen, Be. (ATM). Fuglen var fargemerket, og tallkoden ble avlest. Den var ringmerket som reirunge i Ungarn tidligere dette året. Dette er andre obs. av svartehavsmåke i Hordaland og Bergen. Det første var en 3K på Tveitevannet, Be. 22/7-6/10-96. Denne var utrolig nok også ringmerket i Ungarn, men i 1994. Observasjonen er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Dvergmåke *Larus minutus* 1 1K Byparken, Be. 14/9*(F,V) (Terje Kolaas,BOH m.fl.), som er 1. funn i Bergen. 1 ad. Herdla 14/11* (ATM,A.A.Ribe), er 2. funn på Herdla, det første var 1/9-73. Seks funn i Hordaland nå.

Fiskemåke *Larus canus* Høye noteringer: 625 ind. Herdla 10/5, og ca. 2200 Byparken, Be. 23.12 (ATM).

Grønlandsmåke *Larus glaucooides* 10. Funn i fylket: 1 1K/2K Langøyyna, Fjell 31/12* (MFR).

Polarmåke *Larus hyperboreus* 1 ad. Herdla 15/2, og 1/11-31/12. Femte vinteren dette individet overvintret på Herdla. Ingen flere obs. enn denne er labert.

Lomvi *Uria aalge* Obs. uvanlig langt inne i fjordsystemet: 4 Puddefjorden, Be. 4/10 (MFR). 1 Store Lungegårdsvann, Be. 19/10 (ATM).

Teist *Cephus grylle* Høy notering: 14 ind. Fedje 24/11 (FFA,ATM,MFR). Teisten hekker spredt langs kysten av fylket, men ingen gode estimater foreligger. Alle hekkeindikasjoner, og større ansamlinger bør meldes inn til LRSK.

Alkekonge *Alle alle* Uvanlig lokalitet: Etter kraftig vestlig vind ble et ind. funnet utmattet på Nesttun, Be. primo nov. Fuglen ble tatt i forvaring, og senere sluppet på Osterøy (TBR).

Lunde *Fratercula arctica* Høy notering: 304 på nordtrekk Turøy 8/5 (TFS).

Ringdue *Columba palumbus* Høye noteringer vinterstid: 70+ Høyland, Stord 1/12 (THH), etter dette flere flokker på ca. 20 ind. 25 ind. Milde, Be. 31/12 (THA).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* Høyt antall: Hele 35 ind. Herdla 11/11.

Turteldue *Streptopelia turtur* 1 ind. Herdla 27/9-11/10*(V) (BOH,EFR,ECH). Det foreligger nå i overkant av førti funn i Hordaland.

Perleugle *Aegolius funereus* 1 Aker Stord, Stord 7/3 (THH,ØBI,Magne Klemmensen). Denne obs. må sees i sammenheng med den massive invasjonen av arten høsten 1996.

Vendehals *Jynx torquilla* Hekkefunn: 7 pull. rm. Valestrand, Osterøy 25/6 (TBR,EFR). Alle obs. av vendehals bør rapporteres.

Gråspett *Picus canus* Hekking: 1 par Bruvik, Vaksdal primo juni (TBR). Ellers alle rapporterte funn: 1F Turøy 5/1 (MFR,FFA). 1M rm. Turøy 10/10, 1F rm. 11/10, og et ind. obs. 3. og 7.11 (TFS). 1F Fedje 24/11 (FFA,ATM,MFR). 1 Herdla 1/1, og 4 enkeltind. i perioden 23/9-22/11.

Grønnspekk *Picus viridis* Hekking: 1 par mai Valestrand, Osterøy (TBR). Sannsynlig hekking: 1 par (hekkekode C8) Lægreid, Eidfjord 21-22/5 (FFA,Lars E. Johannessen).

Flaggspett *Dendrocopos major* 1 Kråkenes, Be. 1/1 (OMO). Store mengder flaggspett var på drift i tusentalls vestover gjennom Finland og Russland på sensommeren. Kun små mengder av dette nådde Norge og Vestlandet. Alle obs; 15 ind. Turøy 16/8-15/10 (4 rm.) (TFS). Obs. på Herdla fra 6/9, og topp 26/10 med 6 ind. 1 Mildevann, Be. 22/10 (EFR).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos* Hekking: 1 par mai Valestrand, Osterøy (TBR).

Dvergspett *Dendrocopos minor* 1 Sveio 14/8 (RVO). Tatt i betraktning at dvergspetten er i kraftig nedgang i Sverige, og trolig også til dels Norge, ønsker vi alle funn av denne arten innrapportert til LRSK.

Sanglerke *Alauda arvensis* Vinterfunn: 4 Stend, Be. 30/11, og 3 s.st. 25/12 (NOF). 2 ind. Kaland, Be. 30/11 (NOF).

Låvesvale *Hirundo rustica* 1055 ind. rm. på Ulvenvatnet, Os i løpet av høsten. En nedgang fra 1996, da det ble rm. ca. 1400 ind. (TBR).

Tartarpiplerke *Anthus novaeseelandiae* 1 trekkende mot N Turøy 28/9* (ATM,ABR), er 1. funn på øya. Ellers; hele 4 ind. Fedje 9/10* (BOH). 1 ind. Herdla 15/10* (FHP), og 1 s.st. 14/11* (ATM,A.Fuentes, A.A.Ribe). En av de mer trofaste sjeldenhetene fra øst som besøker fylket hvert år. Kun et funn (av 56 ind.) sør for Bergen!

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni* 1 ind. Fedje 5/10 (V) (BOH). 1 ind. fanget og ringmerket Turøy 10/10, observert fram til 12/10 (F,V) (ATM,FFA m.fl.). 2. og 3. Funn i Hordaland. Det første var i 1996, da et ind. var på Turøy 18-22/10. Alle fuglene viste karakterer til underarten *yunannensis*, som hekker lenger vest enn den andre rasen *hodgsoni*. Funnene fra 1997 er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Trepiplerke *Anthus trivialis* Et høyt tall for kyststrøkene våre er 25 trekkende ind. på Turøy 1/9 (Trond E. Brobakk,FFA).

Heipiplerke *Anthus pratensis* Vinterfunn: 2 7/12 Herdla (THA,EHA,OMO), og 1 Husebø, Holsnøy 13/12 (EHA,THA).

Gulerle *Motacilla flava* Også dette en art som kun påtreffes i mindre tall hos oss. Alle obs; 1M (flava) Herdla 1/5 (THA,EHA,OMO,ENA), som er det niende funnet av denne underarten i fylket. 1 Turøy 8/5 (FFA,Geir Stene). 1M (thunbergi) Liset, Eidfjord 23/5 (FFA). 6 ind. 31/8-13/9 Turøy (TFS). 1 Herdla 15/10 (FHP).

Vintererle *Motacilla cinerea* 1F Malas skiferbrudd, Voss 6/7 (EHA,THA). Enkeltind. observert på direkte trekk 25/9, 28/9 og 5/10 på Turøy (ATM).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii* Eneste obs. er 1M på Haukås, Be. 27/3 (EFR). En svak forekomst av underarten.

Sidensvans *Bombycilla garrulus* 1 ind. Turøy 3. og 7/11 (TFS). 5 ind. 22/11 Herdla (FHP,OMO m.fl.). 4 ind. Fedje 24/11 (ATM,FFA,MFR) . 17 ind. v. Grieghallen, Be. 28/11 (FFA,ATM). 4 ind Nøstet, Be. 3/12 (ATM). En veldig laber opptreden av denne arten (da få rapporterer den?). Send inn observasjonene dere har.

Fossefall *Cinclus cinclus* 137 pull. og 64 ad. rm. i Hordaland i år. De nordligste og sørligste delene av fylket ikke besøkt (TBR).

Jernspurv *Prunella modularis* Sterk forekomst på Valestrand, Osterøy da hele 620 ind. ble ringmerket i aug. og sept. (TBR). Vinterfunn: 1 ind. på foringsplass Totland, Be. 30-31/12 (Gunnar Kjeilen).

Blåstrupe *Luscinia svecica* Sjelden fugl på trekk i ytre kyststrøk. 1F rm. Turøy 18/5 (TFS). Ellers ble 1 par observert på Mæland i Øvstedalen, Voss 10/6 og 1/7 (ATM,OOV) som vel er en noe uvanlig lavtliggende og vestlig lokalitet.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros* 1 ad.M Turøy 18/5*(F) (MFR,ATM,FFA,EFR m.fl.), som er andre funn på øya. 1 sy. 2K M Finse stasjon, Ulvik 11/7* (FHP). Også i 1996 ble arten registrert på Finse, da en ad.M 5-7/7. Det 18. og 19. funnet i Hordaland.

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* Hekking: 1 par hekket i holk 8/6 Hesjedal, Vaksdal (TBR). Ellers: M rm. 9 og 24/5 Turøy (TFS), og 8 ind. obs. 27/8-12/10, hvorav 4 rm. (TFS). Svak forekomst av en art som vi gjerne skulle visst mer om i fylket. Meld fra om alle funn.

Grønlandsteinskvett *Oenanthe oenanthe leucorhoa* 11 ind. (10 rm.) Turøy 7-17/5*(F) (TFS). Fuglene var i meget god kondisjon, med mye fett lagret på kroppen. Alle som ble fanget på Turøy i perioden tilhørte denne underarten, som hekker på Island og Grønland. Mye tyder på at de avventet værforholdene, før de etter hvert skulle ta til med den lange reisen vestover. Kun et funn av leucorhoa i Hordaland fra før, men trolig gjester de oss årlig.

Gråtrost *Turdus pilaris* Høyt antall: 10800 sørtrekkende ind. Turøy 15/10 (TFS).

Måltrost *Turdus philomelos* Sein obs: 3 ind. 23/11 (BOH,KSA,TLI), og 1 24/11 Fedje (ATM,FFA,MFR). 1 Herdla 30/11 og 20/12-26/12 (EFR,EHA,THA,OMO).

Duetrost *Turdus viscivorus* 2 ind. Sandvin, Odda 9/5 (RVO), og 1 ind. fra Fedje 23/11 (BOH,KSA,TLI).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* 1 sy. Rimbareidtjødno, Stord 18/5* (THH,ØBI). 1 sy. Blomsterdalen, Be. 2-5/6*(F) (Ragnar Vikøren,OMO,MFR,KES m.fl.). 1 sy. Indre Arna, Be. 22/6-11/7*(F) (J.Karlsen,THA,KES m.fl.). Tre obs. i år, gjør at vi nå er oppe i tot. 36 funn. Arten er blitt et årlig innslag på nattsangerturer i fylket.

Myrsanger *Acrocephalus palustris* 1 sy.ind. Husebø, Holsnøy, Meland 19-21/6*(F) (EFR,FFA,ATM m.fl.). Det 3. funnet i fylket, og det første syngende ind. De to foregående funnene dreier seg om 1K-fugler fanget om høsten (Sveio 8/89 og Turøy 10/96). Myrsangeren har en sørøstlig utbredelse i Europa, og i Norge finner vi brorparten av hekkende fugler på Sørøstlandet. Fuglen på Holsnøy ble fanget og ringmerket 21/6.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* 1 ind. rm. Ulvenvatnet, Os 6/8 (TBR), og 4 ind. rm. i per. 26/8-13/9 Turøy (TFS). En langt mer vanlig fugl hos oss enn myrsangeren. Arten hekker fra Oslofjorden, og langs kysten nord til Hordaland. Vi vet lite om bestanden sør i fylket, der den trolig er mest tallrik hos oss. Send inn alle observasjoner.

Gulsanger *Hippolais icterina* 1 sy. Kalandseid, Be. 19/5 (FHP,OMO). 2 sy. Læg Reid, Eidfjord 22-23/5 (FFA). 1 sy. Eikefet, Eksingedalen, Vaksdal 3/6 (ATM,OOV). 1 Hosanger, Osterøy 28/6 (ATM,KES). 8-10 ind. hørt på forskjellige lokaliteter i fylket under fossefallprosjektet (TBR). Første registrering på Turøy, med enkeltind. rm. 1 og 6/8, og 3/9. Uvanlig om høsten i ytre kyststrøk, og sept. er sent for arten (TFS).

Hauksanger *Sylvia nisoria* 1 1K rm. Turøy 16/8*(F) (ATM,FFA,KES,EFR m.fl.). En etter hvert årlig art om høsten, i kyststrøkene. Dette var det 15. funnet i fylket, hvor alle (unntatt 1 ad.M i Sveio 7/83) er 1K-fugler. Alle funnene er i perioden 13/8-22/9.

Møller *Sylvia curruca* Enkeltind obs. Turøy 10/5, 15-19/5, og 6/8 (TFS). Enkeltind. obs. Herdla 23/5 (Julian Bell), 1/6 (OWJ) og 2 Herdla 10/8 (KES). 1 ind. Fedje 5/10 og 9/10 (BOH).

Hagesanger *Sylvia borin* Tidlig vårfunn: 1 14-15/5 Turøy. En meget god opptreden på den samme øya denne høsten, med 78 ind. rm. 12/8-15/10. Trekktoppen var siste halvdel av aug. og begynnelsen av sept. Beste dag var 18 ind. loggført 1/9 (TFS). Også på Valestrand, Osterøy viste arten seg mer vanlig enn normalt; 12 ind. fanget fra aug. til sept. Arten er ikke årlig her i denne perioden (TBR).

Munk *Sylvia atricapilla* Vinter: 1 Nipedalen, Be. 20/11 (MFR). 1M Paradis, Be. 31/12 (Arne og Inger Bergesen). 1M Nygårdshøyden, Be. 9/11-21/12 (Jo Hafsmo,FFA). 1F Nygårdsparken, Be. 9/12 (FFA).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix* Alle obs: 1 sy. Vaksdal 23/5 (TBR). 1 sy. Fjøsanger, Be. 30/5 (Poul Lilleholm), og 2 sy. s.st. 2/6 (OMO). Enkeltind. rm. Turøy 16/5, 7/8, 28/8, 1/9 og 3/9 (TFS), som er en meget god opptreden der.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata* 1 Herdlevær, Øyg. 12/10 (NOF). Trolig fylkets seineste obs. av denne arten, som hovedsakelig trekker i august og tidlig september.

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* 1 ad.M Turøy 19/9*(F) (KES,TLI) og 20/9 (MHA). Det niende funnet, og det sjette voksne ind. Fuglen på Turøy ble fanget og kontrollert. Det viste seg at den var rm. 13 dager tidligere på Outer Skerries, Shetland, Skottland.

Spettmeis *Sitta europaea* Uvanlig bevegelse på arten førte til at 22 ind. ble rm. på Turøy i den korte perioden 22-30/9 (TFS). Ikke før påvist på øya.

Varsler *Lanius excubitor* 1 Mødalen, Kvam 19/1 (Steinar Skrede). 1 Bømlø 17/3 (Peter Mallinson), og 1 Flesland, Be. 31/3 (EHA,THA).

Kornkråke *Corvus frugilegus* 1 Bjelland, Stord 15/1 (THH). 1 Slettebakken, Be. 11/2 og 3 23/2, og igjen på høsten 1 15-16/11 (OMO). 1-3 ind. 15/3-5/4, og opptil 6 ind. høsthalvåret på Herdla. 1 Herdlevær, Øyg. 30/12 (FHP,MFR,OMO).

Svartkråke *Corvus corone corone* 1 ind. 16/5 Turøy (Göran Högstedt). 1 ind. 1/6 Herdla (OWJ), og 1 ind. 11/11 Herdla (MFR). Svartkråke hekker på de britiske øyer, og de vestlige delene av kontinentet. Vår egen "gråkråke" (*C.c.cornix*) har en noe mer østlig utbredelse. Det er ikke uvanlig med hybridisering mellom disse underartene.

Pilfink *Passer montanus* En art som tydeligvis er inne i en ekspansjonsfase nordover. Sør i fylket er den allerede påvist som hekkefugl, men ennå ikke i de nordlige delene av fylket. Alle obs; 1-2 ind. i perioden 15/2-10/5 Herdla. 2 ind. Toftøy, Øyg. 28/3 (FFA, MFR,ATM,KES). 1 Skånevik, Etne 26/4 (Charles Voie). 1 Odda 28/4 (AOF). 3 ind. Turøy 18/5, og 1-2 ind Turøy 20/8-3/9 (TFS). Fra 4/10-26/12 opptil 9 ind. på Herdla. 6 ind. 12/11 og ut året på foringsplass v/Flesland, Be. (THA,EHA). 3 ind. Sulen, Fedje 23-24/11 (ATM,FFA,MFR,TLI).

Bokfink *Fringilla coelebs* Vinter: 8 Herdla, 31/12. 8 Hjelme, Øyg. 30/12 (FHP,MFR, OMO). Vinteransamlinger bør sendes inn til LRSK.

Gulirisk *Serinus serinus* 1M Fedje 23/11 (V) (BOH,KSA,TLI) og 24/11 (ATM,FFA,MFR). Dette er det første funnet av denne arten i fylket, og det seneste i Norge. Gulirisk hekker nærmest oss i Danmark og Sverige, og tilbringer vinteren rundt Middelhavet. Funnet er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF. Fuglen ble videofilmet. 17 funn i Norge fram til 1995.

Stillits *Carduelis carduelis* 10 10/1 Herdla. 12 Bjelland, Stord 29/1 (THH). 2 Fagerbakke, Austervoll 5/3 (Karl A. Drivenes). 3 2/3, økende til opptil 11 ind. medio mars Ulveset, Fjell (Erna Egeland). 5 ind. Ulvenvannet, Os 18/11 (ATM,OOV). Opptil 5 ind. i perioden 15/10-26/12, Herdla. 2 ind. 25-30/12 Flesland, Be. (THA,EHA). 5 Herdlevær, Øyg. 30/12 (FHP,MFR,OMO).

Brunsisik *Carduelis flammea cabaret* 22 ind. rm. på Turøy i løpet av høsten. En laber gråsisikhøst, hvor den større C.f.flammea i liten grad var tilstedeværende fram til stasjonen la ned for året primo november (TFS).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus* 1 sy. 2K M Mørkdalsdeltaet, Voss 8/6* (ECH,EHA, OMO,THA). 1 sy. M Vetlavatnet, Voss 8/6* (ECH,EHA,OMO,THA). Fra Turøy: 1 1K rm. 17/8*(F) (FFA,KES), 1K rm. 13/9 (ATM,BOH,EHA,KMJ,THA), 1K rm. 19. og sett fram til 24/9*(F) (KES,TLI,FFA m.fl.), 1K rm. 20/9*(F) (FFA,TLI,ABR), og til slutt 1 1K obs. 4/10 (ATM). Tidens beste opptreden av arten i Hordaland, med to syngende hanner, og fem 1K'er. Vi har nå 18 funn av rosenfink i fylket. Rosenfink finnes hovedsakelig som hekkefugl på sørøstlandet i Norge.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* 1 Nygårdsparken, Be. 17/3 (ATM). 2 ind. 9/11, 8 ind. 13/11, 10 ind. 9/12 og 11 ind 30/12* Nygårdsparken, Be. (ATM,ENA,FFA, MFR,TLI m.fl). Oasen Nygårdsparken i Bergen begynner etter hvert å bli en etablert overvintringsplass for kjernebitere.

Lappspurv *Calcaruis lapponicus* Alle trekkobservasjoner: 1M 3/5, 2F 10/5 Herdla. 1 Turøy 17/5 (ATM). 2 Turøy 10/10 (TFS). 1 15/10, 2 1/11 og 1 2/11 Herdla.

Snøspurv *Plectrophenax nivalis* Vinter: 1 ind. Toftøy, Øyg. 5/1 (MFR,ATM,FFA). Høy notering: ca. 100 ind. Herdla 18/3 (ATM,FFA).

Hortulan *Emberiza hortulana* 9. funn i fylket: 1 ind. Austrepollen, Kvinnherrad 18/9* (ATM,Torbjørn Ergon). Alle funn hos oss er gjort på trekk i mai, eller sept./okt. Hortulanen er en meget sparsomt utbredt art i Norge, og den hekker i all hovedsak på østlandet.

Vierspurv *Emberiza rustica*: 1 ind. Fedje 9/10*(V) (BOH), som er 2. registrering i Hordaland. Første funn var en ad.M 29/4-87 på Fedje. Også en art med typisk østlig utbredelse og trekk. Sjelden gjest på vestlandskysten. De fleste norske hekkefuglene finner vi i Hedmark.

Sibirspurv *Emberiza aureola* 1 1K fanget og rm. Turøy 5/10 (F) (ABR,ATM,FFA m.fl.). 2. funn av denne østlige arten i Hordaland. Det første var på Herdla 21/9-84. Oktober er en uvanlig sen måned for sibirspurv i Nord-Europa, og dette er det desidert seineste i Norge. Observasjonen er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Observatørliste

AOF	Arne O. Flattun
ABR	Arild Breistøl
ATM	Alf Tore Mjøs
BOH	Bjørn Ove Høyland
DHG	Dag H. Gjerde
ECH	Eddie Chapman
EFR	Egil Frantzen
EHA	Espen Hansen
ENA	Eirik Nydal Adolfsen
FFA	Frode Falkenberg
FHP	Frank Helén Pedersen
JFØ	Jostein Førde
KES	Kjell Erik Solheim
KMJ	Kjell Mjølshes
KSA	Kjetil Salomonsen
LØK	Lars Økland
MFR	Michael Fredriksen
MHA	Morten Hage
MHE	Marilyn Hewish
NOF	NOF-ekskursjon
OMO	Ottar M. Osaland
OOV	Olav Overvoll
OWJ	Odd W. Jacobsen
RGL	Reinert Gloppen
RVO	Rune Voie
TBR	Tor Bjarte Reigstad
TFS	Turøy Fuglestad
THA	Terje Hansen
THH	Tor Helge Heggland
TLI	Terje Lislevand
ØBI	Øyvind Bie

Litteratur

- Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S.1994. Norsk fugleatlas. NOF, Klæbu.
- Gustad, J.R. 1995. Sjeldne fugler i Norge i 1993 og 1994. Vår fuglefauna 18: 259-302.
- Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo.
- Mjøs, A.T., Falkenberg, F.1998. Trekkfuglundørsøkelser på Turøy 1997. Krompen 27: 74-87.
- LRSK arkiv. Upublisert.
- Osaland, O. 1998. Fugleobservasjonar frå Herdla 1997. Krompen 27: 116-123.
- Pedersen, F.H. 1998. Sjeldne fugler i Hordaland 1997. LRSK rapp. Krompen 27: 106-110.