

# Fugler i Hordaland 2005



Av Frode Falkenberg, Michael Fredriksen, Jostein Kjærandsen  
og Eirik Nydal Adolfsen

*Svarthalespove Limosa limosa islandica på Herdla, Askøy 27. september 2005.  
Foto: Frode Falkenberg.*

## **Fugleåret 2005**

Like etter nyttår ankom stormen "Inga" Norge. Den hadde feid over Storbritannia før den kom til oss, og med på lasset fikk vi besøk av store mengder vipere. Vipene holdt seg en periode, men de aller fleste forsvant før februar måned. I kjølvannet av stormen var det også andre arter som fikk en god vinteropptreden hos oss, blant annet hvitkinngås og lappspove. En hvitfaset jaktfalk ("grønlandsfalk") var en uventet gjest på Herdla fra slutten av januar til 5. februar. Den faste ringnebbmåken i Bergen (12. overvintring) holdt seg til starten av mars, mens en ung dvergmåke var i Lindås i slutten av februar. Dette var bare det andre vinterfunnet i fylket. I mars var det også en svartstrupe tilbake på den gamle hekkeplassen på Ågotnes, Fjell. Den sang og flottet seg veldig, men det var ingen tegn til hunner i nærheten og hekking ble ikke påvist. Tidlig i juni ble et varslende par med gresshoppesanger sett på Telavåg i Sund kommune, noe som skulle indikere at de hadde mer å fare med enn sinte lyder... Fra slutten av august og gjennom september opplevde vi en strålende opptreden av unge islandske svarthalespover. 25. august ble en historisk liredag, da rekordtall ble registrert av både hav- og grålire forbi Bømlo. Allerede 21. september dukket den første gulbrynsangeren opp, og det var startskuddet for den beste

opptredenen av arten i Hordalands historie. I september og oktober fikk vi også besøk av 3-4 rosenstærer, noe som også vil bli årsbeste for fylket. Både praktærfuglen og ringnebbmåken kom tilbake til sine hhv. 20. og 13. overvintring på Herdla og i Byparken.

## Komiteens arbeid og årets rapportering

Denne rapporten baserer seg på observasjoner som ble sendt inn til bruk på NOF Hordalands hjemmeside [www.cyberbirding.no/nof/](http://www.cyberbirding.no/nof/), samt et utvalg andre observasjoner. Til sammen nærmere 2000 funn danner grunnlaget for rapporten. 146 saker ble innsendt med beskrivelse for godkjenning av LRSK. Ti av disse ble underkjent, mens 14 ble videresendt til den nasjonale sjeldenhetskomiteen, NSKF, for behandling der. Komiteen besto i rapportperioden av Frode Falkenberg (sekretær), Michael Fredriksen, Jostein Kjørandsen og Eirik Nydal. For en fullstendig oversikt over initialene til observatørene som har bidratt med observasjoner til rapporten, se på nettsiden <http://cyberbirding.no/nof/observatorer/>. Takk til alle sammen!

## Forkortelser brukt i rapporten

\* - Observasjonen er behandlet og godkjent av LRSK

(F,V) - Observasjonen er foto- eller videodokumentert

Ad. - Fuglens fjærdrakt som voksen (adult)

Juv. - Fuglens første fjærdrakt (juvenile)

Pull. - Reirunge, eller ikke flygedyktig fugl (pullus)

M - Hann

F - Hunn

FF/ind. - Hunnfarget

1K, 1K+, 2K+ etc. - Angir alder etter kalenderårsystemet

N,S etc. - Trekkretning nord eller sør etc.

Sy. - Syngende

Rm. - Ringmerket

S.st. - Samme sted

As. - Askøy kommune

Be. - Bergen kommune

Øyg. - Øygarden kommune

## Smålom *Gavia stellata*

Direkte trekk og vinter: 1 ad. Kyvikjo, Stord 1.1.-11.2 (THH) og 1 2K s.st. 5.2 (THH). 2 ind. Klokkevatnet, Be. 29.-30.3 (S.Pettersen). Vårtrekket innledes med 1 N Tjeldstø, Øyg. 24.3 (JBE). På Skogsøy, Øyg. ble det i perioden 25.3.-19.5 talt hele 1149 nordtrekkende ind. (BAN,HTO,JBE,JDJ,MFR,THA), med 251 N [kl. 05.30-13.00] 10.5 (JBE,HTO) og 591 N [kl. 05.20-13.00] 14.5 (JBE) som beste dagsnoteringer. Høsttrekket innledes med 2 S Hiskjø, Bømlø 25.8 (JKJ) og på Skogsøy, Øyg. ble det talt 371 sør-trekkende ind. i perioden 2.9.-18.11 (IFR,

JBE,JDJ,MFR,THA,ATM,K.Tvedt), med beste dagsnotering 80 S [kl. 8.30-11.00] 5.11 (JBE). Fra Fedje, Fedje er det rapportert 20 S 8.10. (THA m.fl.) og 12 S 16.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI).

## Storlom *Gavia arctica*

Alle funn unntatt hekking: 1 N Skogsøy, Øyg. 28.4 (JDJ). 3 N [kl. 05.30-13.00] s.st. 10.5 (JBE,HTO) og 1 N s.st. 14.5 (JBE). 2 ind. Kalandsvannet, Be. 5.5 (RVI). 1 ad. Reinsnosvatnet, Odda 22.5 (IMÅ). 1 1K Gjernesmoen, Voss 7.9 (OHE). 1 1K Sævarhagsvikjo, Stord 16.9 (THH). 1 1K Grandane, Voss 23.9 (OHE).



Voksen islom *Gavia immer* på Herdla, Askøy 15. oktober 2005. I løpet av de siste ti åra har den årlige funnmassen av arten økt betraktelig i Hordaland. Foto: Terje Hansen.

#### **Islom *Gavia immer*** [179/269-20/39]

Alle funn: 1 S Solberg, Øyg. 14.1 (JBE). 1 ad. Herdla, As. 12.-15.2 (EFR,DGJ,OMO m.fl.). På Skogsøy, Øyg. ble det observert nordtrekkende enkeltind. 28.4 (JDJ), 30.4 (JBE) og 14.5 (JBE), mens 1 ind. tilsynelatende holdt seg stasjonært der i perioden 2.-14.5 (JBE). Høsttrekket på Skogsøy, Øyg. var bra med 1 S 10.9 (JBE), 1 imm. S 17.9 (IFR,MFR,THA,ATM), 1 ad. S 21.9 (JBE), 3 ind. [1 ad. N + 2 imm. S] 15.10 (ATM). 2 S [ad. + imm.] 16.10 (ATM,K. Tvedt), 1 S 31.10 (JBE), 6 S [hvorav 3 ad. i sommerdrakt] 2.11 (ATM), 9 S [ny dagsrekord i fylket!] 5.11 (JBE,ATM), og 2 S 18.11 (JBE,JDJ). Forrige toppdag var også på Skogsøy, da åtte fugler trakk nord 3.11 2001. Andre høst- og vinterfunn inkluderer 2 ind. Fedjefjorden, Fedje 8.10 (FFA,MFR), 1 ind. Herdla, As. 15.10 (BAN,THA,GJE), 1 S Svellingen, Øyg. 22.11 (JBE), 1 ind. Herdla, As. 27.11 (FFA,ATM), og 2 ind. Skogsøy, Øyg. 30.12 (JBE). 39 ind. i år er rundt gjennomsnittet i Hordaland de siste fem åra.

#### **Gulnebbloom *Gavia adamsii*** [116/307-14/53]

Alle funn: Vårtrekket forbi Skogsøy, Øyg. var bra med 1 ad. N 30.4 (JBE), 1 ad. N 1.5 (BAN,MFR,THA), 4 N [kl. 5.30-11.00] 5.5 (JBE), 10 N [kl. 5.30-12.30] 6.5 (JBE,HTO), 14 N [kl. 05.30-13.00] 10.5 (JBE,HTO), 5 N [kl. 05.30-12.00] 12.5 (JBE), 8 N [kl. 05.20-13.00] 14.5 (JBE), 2 N [kl. 05.30-12.00] 19.5 (JBE). Også 2 N Golten, Sund 1.5 (EFR,LFR). Høstobservasjoner inkluderer 1 S Skogsøy, Øyg. 15.9 (JBE), 1 imm. S s.st. 8.10 (JBE), 2 N s.st. 18.11 (JBE,JDJ), 1 imm. S Golten, Sund 28.9 (FFA), og 1 1K Herdla, As. 19.-27.11 (ENY,JOP,OMO m.fl.).

#### **Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis***

Alle funn: Ingen hekking ble konstatert i 2005 men et spillende og kurtiserende par Ulvenvatnet, Os 30.5.-6.6 (SBY,IGR), 1 ind. Vestbøstادتjødno, Fitjar 20.8. (THH), og 2-3 1K Kalandsvika, Be. 25.8 (FFA) kan muligens dreie seg om lokale hekkefugler. Enkeltindivider er ellers notert fra Hamretjern, Be. 1.1.-7.2 (BAN,THA,JBE m.fl.), Klokkarvatnet, Be. 22.1 (THA), Hæreidsjøen, Eidfjord 5.2 (ATM), Bergegrend, Fusa 15.-19.3 (SSO). Tjeldstø kai, Øyg. 12.10 (JBE), Paddehola, Herdla,

As. 16.10 (OWJ), Skjenavann, Be. 24.10 (THA), Tjeldstø, Øyg. 9.-17.11 (JBE), Sævarhagsvikjo, Stord 12.11 [første funn i vika] (THH), Langavannet, Be. 14.11 (NTL), Krokeide, Be. 8.12 (IFR), Eio, Eidfjord 17.12 (ATM), Hamre, Be. 19.12 (HSA), og Sagvåg havn, Stord 30.12 (THH). Året ble avsluttet med 2 ind. Hamretjern, Be. 31.12. (BAN,THA).

### **Gråstrupedykker** *Podiceps griseigena*

Alle funn: Tre ind. trakk sør forbi Skogsøy, Øyg. i perioden 2.-16.10. (JBE,JDJ,ATM,K.Tvedt). Enkeltindivider ble ellers observert på Hiskjo, Bømlø 1.1.-20.2. (KBE,KKA,OHA,LØK,S.Roth), Skogsøy, Øyg. 22.1. (JBE), Herdla, As. 6.-15.2. (ENA,EFR,DGJ m.fl.), Herdla, As. 12.-29.10. (IFR,MFR,OWJ m.fl.) og 19.-20.11. (ENY,JOP,OMO m.fl.), Skogsøy, Øyg. 18.11. (JBE,JDJ), Hiskjo, Bømlø 20.11.-8.12. (OHA,SRO), og Raunane, Be. 3.12. (THA).

### **Hornedykker** *Podiceps auritus* [35/50-4/6] etter 1992

Alle funn: 1 ind. Djupevågen, Fusa 5.1 (SSO), var første funn i kommunen. 1 ind. Herdla, As. 15.1.-12.2 (EFR,JDJ m.fl.). 3 ind. Grandane, Voss 17.4 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 15.-22.10 (BAN,THA,GJE m.fl.).

### **Grålire** *Puffinus griseus* [26/187-9/102]

Alle funn: Et kraftig lavtrykk med opp mot sørlig liten storm og kraftig regn den 24.8. blåste mange havfugler inn til kysten og opplett med rolig vestavind dagen derpå ga ny dagsrekord i fylket da 85 grålire ble notert sørtrekkende forbi Hiskjo, Bømlø [kl. 7.30-16.00] 25.8\* (JKJ). Forrige makstall var 79 S forbi Skogsøy i Øygarden 9. september 2000. Andre høsttrekkere inkluderer 1 N Skogsøy, Øyg. 30.7\* (JBE,JDJ), 4 S Skogsøy, Øyg. 5.8\* (JBE), 1 S [kl.7.30-10] Hiskjo, Bømlø 16.8\* (JKJ,A.Knutsen,S.Roth), 3 S [kl. 8-14] Hiskjo, Bømlø 22.8\* (JKJ), 5 N Skogsøy, Øyg. 17.9\* (IFR,MFR,THA,ATM) og enkeltind. s.st. 24.9\* (ATM), 1.10\* (ATM) og 8.10\* (JBE).

### **Havlire** *Puffinus puffinus* [34/113-4/80]

Alle funn: 75 S [kl. 7.30-16.00] forbi Hiskjo, Bømlø 25.8\* (JKJ) var også ny dagsrekord i fylket (se under grålire). Forrige makstall var 24 ind. forbi Skogsøy i Øygarden 14. juli 1996. Andre funn inkluderer 1 S Skogsøy, Øyg. 21.7\* (JBE), 1 N + 1 S Skogsøy, Øyg. 5.8\* (JBE), 1 S + 1 N Skogsøy, Øyg. 28.8\* (ENA,THA).

### **Havsvale** *Hydrobates pelagicus*

Alle funn: 9 N; klokka 6-10 Skogsøy, Øyg. 30.7 (JBE,JDJ). 19 ind; 16 rm. + 3 kontroller Vinappen, Fedje 21.8 (ABR,JDJ,FFA m.fl.). Det er meget uvanlig med feltobservasjoner av havsvale hos oss, og dette er definitivt den største konsentrasjonen som har blitt påvist.

### **Havsule** *Sula bassana*

Store antall og uvanlige lokaliteter: 120 N [kl. 05.30-13.00] Skogsøy, Øyg. 10.5 (JBE,HTO). 834 S [kl. 7.30.16.00] Hiskjo, Bømlø 25.8 (JKJ, se kommentar under grålire). 350 S Skogsøy, Øyg. 24.9 (ATM).

### **Storskarv** *Phalacrocorax carbo*

Innlandsfunn, konsentrasjoner og ”mel-lomskarv”: 2 ind. Langvassmyra, Eidfjord 30.7 (IMÅ). 1 ind. Kalandsvatnet, Be. 16.-26.8 (BAN). 1 ind. (bestemt til *P. c. carbo*) med fiskesnøre hengende ut av nebbet Bjoreio, Eidfjord 17.8 (T.Wiers). 1 ind. *P. c. sinensis* (mellomskarv) Tjeldstø, Øyg. 1.9\* (F) (JBE). 1 ind. Ulvenvatnet, Os 3.9 (S + THH). 1 ind. Fauskanger, As. 2.10 (ATM). 1 ind. Åldlandsvatnet, Stord 17.10 (THH). 1 ind. Grandane, Voss 23.10 (OHE). 4 ind. Storavatnet, Fitjar 27.10 (THH). 5 ind. Storavatnet, Fitjar 6.11 (THH). Antall registreringer av storskarv i innlandet og i ferskvann har økt de siste åra. Mellomskarven fra Øygarden var bare det andre dokumenterte funnet av underarten hos oss. Les mer om bestemming av *carbo* og *sinensis* i Falkenberg (2005c).

### **Knoppsvane** *Cygnus olor*

Alle funn: Det ble konstatert hekking i Gjerdavågen, Bømlø bl. a. 13.5 (OHA,Bømlø-Nytt), og 1 par ble observert i Nordretjødno, Fitjar 14.5 (THH). Obser-



Storskarv av underarten mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis* på Tjeldstø i Øygarden 1. september 2005. Ved identifikasjon av storskarvunderartene trengs meget gode observasjonsforhold eller god dokumentasjon. I vinkelen mellom munnvikene og barhudens bakkant ligger løsningen. Foto: Julian Bell.

vasjoner utenom hekketiden inkluderer: 2 ad. Ådlandsvatnet, Stord 18.-26.2 og 1.-3.4, og 1 ad. s.st. 23.4 (THH). 2 ad. Hiskjo, Bømlo 7.3 (KBE,OHA). 1 ad. Kyrkjeberget, Stord 24.-29.3 (THH). 2 ad. Førdepollen, Sveio 6.10 (THH). 2 ind. Haukås, Sveio 31.10 (LØK). 1 ad. Gjelmervik, Etne 4.12 (OHE). 4 ad. Eldøy, Stord 9.-14.12 (THH). 4 ad. Ådlandsvatnet, Stord 11.-30.12 (THH).

#### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Juni til august: 2 2K Granvinsdeltaet, Granvin 2.6 (TLI). 1 2K Sandvin, Odda 12.6 (IMÅ). 1 ad. Rommetveit, Stord 26.6 (THH). 1 ad. Fjell, Fjell 2.7 (FFA). Fuglen fra Fjell har vært på lokaliteten i flere år, og er trolig skadet.

#### **Sædgås** *Anser fabalis* [22/85-2/2]

Alle funn: 2 ind. trolig A. f. rossicus Lun-

darosen, Voss 1.1.-5.2 (F) (OHE). 1 ind. A. f. fabalis Herdla, As. 25.5\* (EFR,OMO). 1 ind. Herdla, As. 15.-22.10\* (F) (BAN,THA,GJE m.fl.). Tundrasædgjesene ble innsendt til NSKF i fjor, men behandlingen er foreløpig ikke ferdig.

#### **Kortnebbgås** *Anser brachyrhynchus*

Alle funn: Våren innledes med 1 ind. Herdla, As. 22.-23.3 (BAN,BWA). 2 ind. rastet sammen 20 grågjess Kollsnes, Øyg. 18.4 (KPG). 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 26.-27.4 (THH). 3 ind. Ulvikpollen, Ulvik 2.6 (TLI). Høstens første på Herdla, As. ble sett 8.9 (EFR,OMO), deretter følger en tilnærmet normalfordeligningskurve med 4 ind. 21.9 (DGJ), 5 ind. 23.9 (EFR,OMO), 10 ind. 1.-2.10 (THA,IFR,MFR,ATM), 9 ind. 12.10 (IFR,MFR), 5 ind. 21.10 (ENY), og 1 ind. 10.-18.12 (THA,DGJ,OMO). Hele 33 S forbi Drotningvik, Be. 28.9 (FFA).

Til slutt 1 ind. Prestegardslandet, Voss  
28.10.-13.11 (ECH,OHE).

**Tundragås** *Anser albifrons* [73/379-2/7]

Alle funn: 2 ad. tilhørende A. a. albifrons  
Melsvatnet, Voss 16.1.-5.2 (OHE,ATM). 6  
ad. tilhørende A. a. flavirostris Herdla, As.  
12.10 (IFR,MFR). En tundragås holdt seg  
på Voss før nyttår, og kun et ind. herfra er  
innregnet i funnmassen som nytt.

**Grågås** *Anser anser*

Desember - februar: 7 ind. Kollsnes, Øyg.  
1.-11.1 (JBE). Samme flokk ble sett i Brei-  
vik, Øyg. 19.1 (JBE). 2 ind. Stend, Be.  
10.1 (THA). 6 ind. Gåsland, Bømlo 13.1  
(LØK). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 13.-18.1  
(JBE,MFR,THA m.fl.). 2 ad. Melsvatnet,  
Voss 16.1.-5.2 (OHE,ATM). 2 ind. Tjeld-  
stø, Øyg. 20.-23.1 (JBE). 2 ind. Kaland-  
svika, Be. 22.1 (THA). 2 ind. Herdla, As.  
23.1 (IFR,MFR,THA m.fl.). 8 ind. Herdla,  
As. 25.1 (ABR,FFA,GHÖ). 13 ind. Herd-  
la, As. 29.1 (JDJ). 1 ind. Herdla, As. 2.12  
(HSA). 9 ind. Nedre Økland, Stord 10.-

24.12 (THH). 8 ind. Storavatnet, Bømlo  
19.12 (LØK).

**Hvitkinngås** *Branta leucopsis*

Alle funn: Et godt år for arten i Horda-  
land. Mange vinterfunn begynte på Herd-  
la, As. med 1 ind. 1.1.-22.2 (THA m.fl.),  
3 ind. 14.1 (MJO,OMO), 5 ind. 22.-23.1  
(DGJ,IGR m.fl.), 2 ind. 6.2 (ENA), og 1  
ind. 27.3 (S. Sondbø). Ellers: 1 ind. Tjeld-  
stø, Øyg. 14.-19.1 (JBE,MFR,THA m.fl.).  
1 ind. Hovland, Bømlo 19.1 (RHO). 4  
ind. Sveio, Sveio 26.1 (JKN). 1 ind. Koll-  
snes, Øyg. 27.1 (KPG). God dekning på  
Skogsøy, Øyg. i perioden for vårtrekket  
ga full uttelling med 1801 N [kl. 6.15-  
14.00] 28.4 (JDJ), 110 N [kl. 5.30-11.00]  
30.4 (JBE). 8 N 10.5 (JBE,HTO), hele  
6695 N [kl. 05.30-13.15] 12.5 (JBE) hvil-  
ket var ny toppnotering på en dag i fylket  
(Falkenberg 2005a)! 3500 N [frem til kl.  
11.30] ble også talt fra Goltasteinen, Sund  
12.5 (SBY). Kun 2 N Skogsøy, Øyg. 14.5  
(JBE). To sommerfunn: 1 ind. sammen  
med 13 grågjess Kjøl, Bømlo 20.5 (OHA)

*I forbindelse med stormen "Inga" i januar, dukket det opp uvanlige vintermengder av hvitkinngås  
Branta leucopsis. Disse fuglene stammer fra Sveio 26. januar 2005. Foto: Jan Kåre Ness.*



og 1 ind. Hellsøy, Fedje 12.6 (IGR). Høsttrekket forbi Skogsøy, Øyg. var som forventet betydelig mer beskjedet med 40 S 18.9 (ABR,FFA,ATM), 4 S 1.10 (ATM), 38 S 2.10 (JBE,JDJ), 1 S 15.10 (ATM), 4 S 16.10 (ATM,K.Tvedt) og 12 S 5.11 (JBE,ATM). En del høstflokker gjorde imidlertid stopp andre steder i fylket: 38 S Fedje N, Fedje 1.10 (FFA). 28 ind., hvorav en skotskmerka fugl Stormark, Fedje 1.10 (FFA,ENY). 28 ind. Herdla, As. 2.10 (IFR,MFR,ATM,IGR). 25 S Fedje, Fedje 2.10(FFA,ENY).5ind.Stormark,Fedje2.10 (ABR,FFA,GHØ,ENY). 21 ind. Stormark, Fedje 9.10 (IFR,MFR). 74 ind. Herdla, As. 12.10 (IFR,MFR). 12 ind. Tjeldstø, Øyg. 14.10 (JBE). 55 ind. Herdla, As. 15.10 (BAN,THA,GJE). 29 ind. Stormark, Fedje 15.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). 31 S Fedje, Fedje 16.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). 49 ind. Herdla, As. 16.10 (OWJ). 1 N Herdlevær, Øyg. 16.10 (IFR,MFR). 14 ind. Stormark, Fedje 16.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). 11 ind. Stormark, Fedje 19.10 (FFA). 2 ind. Stormark, Fedje 20.-21.10 (FFA,TLI). 4 ind. Herdla, As. 21.10 (ENY). 5 ind. Kjøl, Bømlo 22.10 (OHA). 1 ind. Rekvesøyane, Voss 28.10 var første obs. på Voss siden mai 1994. (ECH,OHE), og trolig samme ind. ble også sett s.st. 29.11 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 29.10 (THA,ENY). 4 ind. Fedje 6.11 (DGJ).

### **Ringgås** *Branta bernicla*

Alle funn: 180 N Holmengrå, Fedje 2.6 (SBY). 218 S [kl. 6.30-10.30] Skogsøy, Øyg. 2.9 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 3.9 (GJE,ATM). 151 S [kl. 7-11] Skogsøy, Øyg. 9.9 (JBE). 1 S Rong, Øyg. 14.9 (JBE). I perioden 20.11.-2.12 holdt 1 ad. av underarten B. b. horta seg på Herdla, As. (EFR,ABR,FFA m.fl.).

### **Gravand** *Tadorna ferruginea*

Hekkefunn og funn medio november til medio februar: Ingen vinterfunn er rapportert. Eneste kjente hekkeplass i Hordaland i 2005 var på Herdla, As. hvor 1 par med 7 pulli ble notert 20.7 (ENA). Vi tar også med 12 ind. Sandvin, Odda 12.6 som er et uvanlig høyt tall for lokaliteten (IMÅ).

### **Brunnakke** *Anas penelope*

Desember - februar: Det foreligger en rekke vinterfunn: 12 ind. Herdla, As. 1.1.-1.2 (DGJ,BAN,THA). 16 ind. Tveitevatnet, Be. 1.1 (GKJ). 2 M + 3 F Skjenavann, Be. 12.1 (THA). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 14.1 (JBE). 1 M Øklandsvatnet, Bømlo 15.1 (LØK). 10 M + 15 F Ortuvatnet, Be. 15.-16.1 (KTO,IFR,MFR). 1 F Sandvin, Odda 15.1 (RVO). 3 M + 3 F Skjenavann, Be. 16.1 (THA). 1 M Lønøyane, Voss 16.1 (OHE). 11 M + 10 F Ortuvatnet, Be. 17.1 (KTO). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 18.-20.1 (JBE). 1 F Melsvatnet, Voss 21.-28.1 (OHE). 1 2K M Kalandsvika, Be. 3.2 (FFA). 7 ind. Skjenavann, Be. 5.-9.2 (THA). 22 ind. Ortuvatnet, Be. 19.-20.2 (ATM,FFA). 1 M Solheimsvatnet, Be. 20.2 (FFA,ATM). 6 ind. Tveitevatnet, Be. 20.2 (FFA,ATM). 4 F + 4 M St. Nesttunvann, Be. 27.2 (GKJ). 2 ind. Herdla, As. 2.12 (HSA). 1 ind. Raunane, Be. 3.12 (THA). 1 1K Melsvatnet, Voss 11.12 (OHE). 1 F + 2 M Skjenavatnet, Be. 11.-13.12 (THA). 5 ind. Herdla, As. 14.12 (DGJ). 1 M Skjenavann, Be. 18.12 (THA). 19 ind. Tveitevatnet, Be. 25.12 (ATM). 1 1K Melsvatnet, Voss 26.-30.12 (OHE,KTO). Opp til 9 ind. Store Nesttunvann, Be. 26.-31.12 (GGJ). 26 ind. Ortuvatnet, Be. 27.12 (ATM,KET). Vi tar også med høyeste dagsnotering fra Herdla, As. som var 315 ind. 16.10 (ØWJ).

### **Amerikablesand** *Anas americana* [1/1-0/0]

Alle funn: 1 ad. M Herdla, As. 2.10 (F) (IGR) er trolig samme fugl som i 2004, da den representerte første funn i Hordaland. Funnet er innsendt, men foreløpig ikke ferdigbehandlet av NSKF.

### **Snadderand** *Anas strepera* [25/37-1/1]

Alle funn: 1 M Kristianborgvannet, Be. 9.-11.10\* (F) (EGR,AHÅ,FFA,ABR).

### **Krikkand** *Anas crecca*

Desember - februar: 1 F Byparken, Be. 1.1-24.2 (FFA,OMO,HTO m.fl.). 1 F Gravdal, Be. 1.-16.1 (MFR,IFR). 2 ind. Herdla, As. 2.1 (BAN,THA). 3 M + 4 F Muthaugtjern, Be. 16.1 (THA). 1 F Seimsvatnet, Voss 30.1 (ATM). 1 F Herdla, As. 6.2 (ENA). 7



Årets eneste snadderand *Anas strepera* i Hordaland var denne hannen som holdt seg i Kristianborgvannet i Bergen fra 9. til 11. oktober 2005. Foto: Frode Falkenberg.

ind. Herdla, As. 2.12 (HSA). 2 F + 1 M Kallandsvika, Be. 12.12 (BAN). 7 ind. Herdla, As. 14.-18.12 (DGJ,THA,OMO).

#### **Stjertand** *Anas acuta*

Alle funn: 1 F Herdla, As. 29.1.-12.3 (EFR,ENA m.fl.). 1 M Grandane, Voss 6.4 (OHE). 1 par Ulvikpollen, Ulvik 10.4 (OHE). 1 par Garen, Eidfjord 13.-20.5 (ATM). 1 M Sysendammen, Eidfjord 21.5 (IMÅ,STR,RVO). 1 par Lønaøyane, Voss 1.6 (OHE). På Herdla, As. ble det i løpet av høsten notert 1 ind. 24.-27.8 (ENA,EFR,THA m.fl.), 2 ind. 8.9. (EFR,OMO), 3 ind. 14.9 (ENY,IFR), 4 ind. 23.9 (EFR,OMO), 1 ind. 27.9 (FFA), og 1 ind. 10.12 (THA). Til slutt 4 S Skogsøy, Øyg. 29.9 (JBE). Hele 17 individer av stjertand er et meget godt år i Hordaland. Det årlige gjennomsnittet i perioden 1995

til 2004 har lagt på 8,5 ind. 2001 skiller seg ut som det beste året for arten i Hordaland, da hele 29 ind. ble registrert.

#### **Knekkand** *Anas querquedula* [47/85-1/1]

Alle funn: 1 M Rekvessøyane, Voss 15.5\* (F) (FFA,IFR,MFR,THA) og trolig samme ind. senere på dagen på Grandane, Voss (F) (OHE).

#### **Skjeand** *Anas clypeata*

Alle funn: 1 M Skranevannet, Be. 1.1 (B.Almås). 1 M Storavatnet, Bømlo 15.6 (LØK). 1 ind. Grandane, Voss 23.8 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 27.9 (FFA). 4 ind. Herdla, As. 28.9 (ENY). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 2.10 (JBE,JDJ). 1 ind. Herdla, As. 12.10 (IFR,MFR). 1 F Melsvatnet, Voss 29.11 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 2.-3.12 (HSA,EFR).





Denne krikkand *Anas crecca* hunnen overvintret i Byparken, Bergen fra slutten av oktober 2004 til utgangen av februar 2005. Bildet ble tatt 24. februar. Fuglen var en av 13 ind. som var i fylket de to første månedene av 2005. Foto: Frode Falkenberg.

#### **Taffeland** *Aythya ferina*

Alle funn: 1 M Ådlandsvatnet, Stord 3.4 (THH). 1 M Tveitevatnet, Be. 4.4 (ATM). 1 M Tjeldstø, Øyg. 9.10 (JBE). 1 M Stora-vatnet, Stord 26.12 (THH).

#### **Bergand** *Aythya marila*

Alle funn utenfor hekkeområdene: 2 N Skogsøy, Øyg. 14.5 (JBE) og 1 M Lønøyane, Voss 9.-14.6 (OHE) er eneste vår og sommerfunn. Høsten på Herdla, As. ble eksepsjonell god for arten med 2 ind. 15.-16.10 (BAN,THA,GJE), 15 ind. 21.10 (ENY), 34 ind. 29.10 (THA,ENY), hele 45+ ind. 19.11 (ENY,JOP,OMO), 23 ind. 20.11 (ABR,FFA,OHE), 34 ind. 27.11 (FFA,ATM), 25 ind. 2.12 (HSA), 44 ind. 3.12 (EFR) og 7 ind. 10.-14.12 (THA,DGJ). Andre høstfunn inkluderer 1-2 ind. Tjeldstø, Øyg. 4.-9.10 (JBE). 1 ind. Kjølv, Bømlø 15.-16.10 (OHA). 1 ind. Ostereidet, Lindås 16.10 (MWI). 1 ind. Grandane, Voss 22.-26.10 (OHE).

1 ind. Hopsvannet, Be. 27.10 (THA). 1 ind. Nesttunvatnet, Be. 29.10 (FFA). 1 ind. Skjenavann, Be. 30.10.-5.11 (THA). 1 ind. Rekvesøyane, Voss 7.11 (ATM). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 13.-17.11 (JBE). 2 ind. Granvinvatnet, Granvin 26.11 (ATM). 1 1K Byparken, Be. 9.12 (FFA). 1 hunnfarget ind. Stavanes, Eidfjord 17.12 (ATM). 6 hunnfargete ind. Granvinvatnet, Granvin 26.12 (OHE,KTO).

#### **Bergand x toppand** *Aythya marila x fuligula* [0/0-1/1]

Alle funn: 1 M Garen, Eidfjord 11.-13.5 (F) (ATM). Det er første gang denne hybridkombinasjon har blitt påvist i Hordaland. Funnet er innsendt, men foreløpig ikke godkjent av NSKF.

#### **Mandarinand** *Aix galericulata* [21/25-2/2]

Alle funn: 1 M Aga, Ullensvang 2.5\* (F) (AAG) og trolig samme ind. Kråkevik, Ul-

lensvang 17.5 (K.Kråkevik). 1 M Grandane, Voss 10.5\* (F) (OHE), var ny art for lokaliteten.

### **Ærfugl** *Somateria mollissima*

Konsentrasjoner og ferskvannsfunn: Få innrapporterte konsentrasjoner; Herdla, As. med 1225 ind. hvorav 1060 sørtrekkende 1.10 (THA), 1000+ ind. 12.10 (IFR,MFR), og 1200+ ind. 16.10 (OWJ).

### **Praktærfugl** *Somateria spectabilis* [22/37-0/0]

Alle funn: Tradisjonen tro var den gamle hannen tilbake og feiret 20-års jubileum på Herdla, As. 30.7 -15.10\* (F) (OMO,ABR,GHØ m.fl.). Den ble imidlertid ikke sett i perioden 12.9 -14.10. 1 M som ble sett ved Tjuvholmen, Meland 27.5\* (F) (T.Haugland) er trolig også samme fuglen fra Herdla.

### **Havelle** *Clangula hyemalis*

Hekkefunn og ferskvann vinter: 1 1K/F Tveitevatnet, Be. 1.1 (ATM). 1 M Tverråvatnet, Bømlo 15.1 (LØK). 1 1K Melsvatnet, Voss 19.-30.10, 5.11 og 29.11 (OHE).

### **Svartand** *Melanitta nigra*

Hekkefunn og ferskvann vinter: 2 2K Hæreidsjøen, Eidfjord 5.2 (ATM). 1 par Grandane, Voss 9.6 (OHE). 7 hunnfargete ind. Eio, Eidfjord 17.12 (ATM). Vi tar også med hele 139 ind. Herdla, As. 22.10 (EFR) som trolig er Herdlarekord.

### **Kvinand** *Bucephala clangula*

Ansamlinger: 350+ ind. ved smoltanlegg Skålavikjø, Bømlo 11.1 (LØK). 153 ind. Ljonesvågen, Kvam 27.12 (JMO).

### **Lappfiskand** *Mergellus albellus*

Alle funn: Fra Kalandsvatnet, Be. er det rapportert 1 ind. Kalandsvika 1.1 (THA), 1 ind. Kaland skole 3.2 (BAN), 3 F Kalandsvika 27.-28.3 (BWA), 1 ind. Kalandsvika 12.-14.12 (BAN,OMO), og 2 hunnfargete ind. 19.12 (HSA). Ellers i fylket: 2 ind. Ertrevågen, Be. 16.1 (IFR,MFR). 1 F Eikangervåg, Lindås 20.2.-13.3 (MFR,THA m.fl.). 1 ind. Dalsvatnet, Øyg. 24.10 (JBE).

1 ind. Tjeldstø, Øyg. 29.10 (EFR). 1 hunnfarget ind. Eikangervåg, Lindås 25.12 (MWI). 1 ind. Stordalsvatnet, Etne 31.12 (THÅ,J.Flesland).

### **Myrhauk** *Circus cyaneus* [29/31 til 36-1/1]

Alle funn: Eneste funn var 1 F Herdla, As. 23.1\* (IFR,MFR,THA). Første vinterfunn i Hordaland.

### **Spurvehauk** *Accipiter nisus*

Konsentrasjoner: 21 S Herdlevær, Øyg. 5.11 (ATM,JBE).

### **Musvåk** *Buteo buteo* [50/65-5/8]

Alle funn: 1 ind. Væte, Voss 20.4 (ECH). 1 ind. Sandvin, Odda 1.5 (ALA). 1 ind. Brannfeltet på Hope, Sveio 14.6. (ENA,IFR). 1 varslende par, unger også hørt, Tysnes, Tysnes 1.-4.8 (OOV m.fl.). 1 ind. Svartavatnet, Be. 27.8 (GJE).

### **Vepsevåk** *Pernis apivorus* [4/4-1/1]

Alle funn: 1 ind. Øvre Eidfjord, Eidfjord 9.9\* (ATM). Første funn i Eidfjord kommune.

### **Sivhauk** *Circus aeruginosus* [19/19-1/1]

Alle funn: 1 F Raudholmane, Kvinnherad 14.6\* (F) (SBY m.fl.).

### **Kongeørn** *Aquila chrysaetos*

Uvanlige lokaliteter: 1 2K Milde, Be. 23.1 (EFR). 1 imm. Grøvle, Bømlo 25.12 (ROL).

### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus* [75/75-8/8]

Alle funn: Den gode trenden fra i fjor fortsetter med minst åtte funn. 1 ind. Fjellbirkeland, Be. 8.5 (GKJ). 1 ind. Matre, Masfjorden 16.7 (IGR). 1 ind. Varaldsøy, Kvinnherad 18.-24.7 (L.Selheim). 1 ind. Låte, Odda 3.-10.8 (B. Andersen). 1 ind. Sandvin, Odda 3.8 (J.Eitheim). 1 ind., trolig 1K, Søndre Straumsundet, Øyg. 2.9 (JBE). 1 N Tjeldstø, Øyg. 3.9 (ATM) var trolig samme ind. som det fra Søndre Straumsundet. 1 ind. Egnehjem, Odda 3.9 (ALA). 1 ind. Herdla, As. 5.9 (OWJ).



*Kystobservasjoner av jaktfalk Falco rusticolus er knapt en årlig begivenhet i Hordaland. Denne fuglen fløy over utkikkspunktet på Skogsøy i Øygarden 1. oktober 2005. Foto: Alf Tore Mjøs.*

#### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

November - februar: 1 ind. Vaulane, Stord 22.1 (THH). 1 ind. Herdla, As. 23.1 (IFR,MFR,THA). 1 ind. Herdla, As. 29.1 (EFR). 1 ind. Golten, Sund 30.1 (BAN m.fl.). 1 ind. Baugetveit, Be. 12.2 (NIT,OØS). 1 ind. Herdla, As. 22.2 (IFR,MFR). 1 ind. Hjørmodalen, Eidfjord 6.12 (ATM). 1 M Austrheim, Austrheim 19.12 (OWS). 1 ind. Herdla, As. 30.12 (BAN,THA). 1 ind. Bjørøy, Fjell 31.12 (MFR).

#### **Lerkefalk** *Falco subbuteo* [4/4-1/1]

Alle funn: 1 ind. Langvassmyra, Eidfjord 2.7\* (FST) var bare fylkets femte funn, og den første i Eidfjord kommune.

#### **Jaktfalk** *Falco rusticolus*

Alle funn utenfor hekkeområder: 1 hvitfaset ind., såkalt grønlandsjaktfalk, ble

sett på Herdla, As. 23.1.-5.2 (IFR,MFR,THA,GNO). For nærmere omtale av funnet, se Hansen (2005). Ellers 1 1K S Skogsøy, Øyg. 1.10 (ATM) og 1 ind. Solberg, Øyg. 27.12 (JBE).

#### **Vandrefalk** *Falco peregrinus*

Alle funn utenom hekking: En tydelig økning fra fjoråret med 59 rapporterte funn av ca 66 ind. gjennom hele året.

#### **Vaktel** *Coturnix coturnix* [9/9-3/3]

Alle funn: 1 ropende Sele, Bømlo 19.-20.5\* (S.Roth,KKA,LØK). 1 ropende Vestbøstادتjødno, Fitjar 21.5\* (THH,MKL). 1 ropende Smørås, Be. 19.6\* (G.Gjelsvik,BAN).

#### **Åkerrikse** *Crex crex* [65/68-1/1] etter 1970

Alle funn: Eneste funn var 1 ropende Bjøledalen, Bømlo 7.6.-15.7\* (KBE,LØK).

2004: 1 ropende Rimbareid, Fitjar 30.5-4.6\* (THH). 1 ropende Bjøddledalen, Bømlo 31.5-17.6\* (LØK).

### **Vannrikse** *Rallus aquaticus*

Alle funn: Eneste hekkeindikasjon var fra Rimbareidtjødno, Fitjar hvor 1-2 ropende ind. ble hørt i peroden 14.5-14.6 (THH,MKL,FFA). Høst og vinterfunn: 1 ind. Kalandsvika, Be. 1.1 (THA). 1 ind. Telavåg, Sund 30.1 (BAN m.fl.). 1 ind. Haukåsvassdraget, Be. 7.3 (D.Ødegård). 1 ind. Forvatnet, Be. 13.3 (EFR). 1 ind. Rimbareidtjødno, Fitjar 20.8 (THH). 1 ind. Fedje, Fedje 25.9 (JDJ,MFR m.fl.) og 1 ind. Varden, Fedje 19.10 (FFA) var andre og tredje funn på øya. 1 ind. Telavåg, Sund 16.10 (FFA). 1 ind. Herdla Herdla, As. 22.10 (EFR). 1 ind. Espeland, Flesland, Be. 3.11.-5.11 (THA). 2 ind. Lille Tveitevatnet, Be. 3.11 (ATM). 1 ind. Storavatnet, Fjell 4.11 (ATM). 1 ind. Muthaugtjern, Be. 5.11 (THA). 1 ind. Storavatnet, Be. 5.11 (THA). 1 ind. Haukelandsvatnet, Be. 6.11 (JDJ). 1 ind. Solberg, Øyg. 8.11 (JBE). 3 ind. Turøy, Fjell 13.11 (ECH). 1 ind. Skottaberg, Stord 16.11 (AVA). 1 ind. Espegrend, Flesland, Be. 19.11 (THA). 1 ind. Hjelme, Øyg. 22.11 (JBE). 2 ind. Espegrend, Flesland, Be. 26.11 (HSA). 2 ind. Kloppedalstjern, Be. 4.-31.12 (EGR,GGJ). 1 ind. Eknes, Lindås 14.12 (MWI). 1 ind. Hamre, Be. 19.12 (HSA). 1 ind. Eidsbøen, Austevoll 30.12 (G.Meeren). 1 ind. Hamreelven, Be. 31.12 (BAN,THA).

### **Myrrikse** *Porzana parva* [26/31-1/2] etter 1970

Alle funn: 2 ropende Rimbareidtjødno, Fitjar 21.5\* (THH,MKL). 2004: 1 ropende Vestbøstادتjødno, Fitjar 2.6\* (THH).

### **Sivhøne** *Gallinula chloropus*

Alle funn: Hekkeindikasjon i Langevann, Be. hvor 1 juv. ble obs. 6.8 (NTL). 1 ind. Vestbøstادتjødno, Fitjar 14.6 (FFA) kan muligens også indikere hekking. Elters relativt sparsomt med funn: 1 ind. Hatlestad, Be. 1.1 (THA). 1 ind. Ortuvatnet, Be. 16.-17.1 (IFR,MFR,KTO). 1 2K Hamretjern, Be. 22.1.-9.3 (HSA,AHÅ

m.fl.). 1 ind. Ortuvatnet, Be. 19.-20.2 (ATM,FFA). 1 ind. Vinnesholmen, Fusa 3.-6.4 (D.Solberg,SSO). 1 1K Tveitevatnet, Be. 7.11 (ATM). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 9.-14.11 (JBE). 1 1K Nygårdsparken, Be. 25.11-7.12 (FFA) og 1 1K + 1 ad. s.st. 10.-12.12 (FFA,HSA). 1 ind. Tveitevatnet, Be. 9.-31.12 (OMO,HSA m.fl.). 1 ind. Store Nesttunvatn, Be. 11.12 (BAN m.fl.). 2 1K Tveitevatnet, Be. 27.12 (ATM,KET). 2 ind. Storavatnet, Bømlo 28.12 (GOL).

### **Sothøne** *Fulica atra*

Hekkefunn: Den positive trenden fortsetter og arten synes nå å være etablert som hekkefugl i Bergen med påvist hekking på fire lokaliteter i kommunen i 2005 (Kristianborgvannet, Skranavann, Tveitevatnet, og Ulvenvatnet).

### **Trane** *Grus grus*

Trekk: 2 N Alversund, Lindås 27.3 (H.Bjoldal). 2 ind. Eknes, Lindås 15.4 (MWI). 4 ind. Garen, Eidfjord 23.5 (TKG,ATM). 4 ind. Låte, Odda 26.5 (J.Akse,IMÅ,RVO).

### **Tjeld** *Haematopus ostralegus*

Desember – februar (overvintrende): 1 ind. Rong, Øyg. 9.1 (MFR), 3 ind. Gåsland, Bømlo 18.1 (KKA), 1 ind. Rundøy, Bømlo 19.1 (RHO), 2 ind. Eldøy, Fitjar 15.2 (OOV). Av større trekkkonsentrasjoner kan 561 ind. på sørtrekk forbi Hiskjø, Bømlo 25.8 (JKJ) nevnes.

### **Dverglo** *Charadrius dubius* [10/14-1/1]

Alle funn: 1 ad. Grandane, Voss 13.6\* (F) (OHE). Tilbake på Voss etter fravær i 2004.

### **Sandlo** *Charadrius hiaticula*

Desember - januar: 2 ind. Solberg, Øyg. 14.-16.1 (JBE), 2 ind. Herdla, As. 15.1 (EFR), 4 ind. s.st. 22.1 (GJE,OMO), 3 ind. s.st. 23.1 (DGJ).

### **Boltit** *Charadrius morinellus*

Trekk: 1 F Garen, Eidfjord 15.5 (ATM m.fl.). 3 ind. Gjelland, Voss 16.5 (OHE). 1 F Gullfjellet, Be. 17.5 (JBE). 2 par Haugo,

Voss 16.-18.5 (OHE). 5 ind. Garen, Eidfjord 28.5 (IMÅ). 4 ind. Garen, Eidfjord 29.5 (ATM). 3 ind. Garen, Eidfjord 3.6 (TLD).

### **Heilo** *Pluvialis apricaria*

November til medio februar: 1 ind. Herdla, As. 3.12 (EFR).

### **Tundralo** *Pluvialis squatarola*

Alle funn: 15 (1K) Herdla, As. 28.9 (ENA). 20 (1K) Herdla, As. 2.10 (IFR,MFR,ATM). 1 ind. Herdla, As. 10.12 (THA).

### **Vipe** *Vanellus vanellus*

Desember - januar: Vi var vitne til en uvanlig influx av arten i januar, etter at orkanen Inga hadde sveipt over de britiske øyer. Store mengder viper oppholdt seg spredt i store deler av de lavereliggende delene av fylket de påfølgende ukene. I løpet av de fem første dagene (13.-18.1) etter orkanen ble nærmere 2000 ind. observert i Sør-Norge (Falkenberg 2005). I Hordaland dukket de første fuglene opp 13.1 og det ble observert nærmere 500 viper frem til 23.1. Kommunevis fordelig av funnene er framstilt i figur 1. Noen få individer holdt stand ut i februar og det antas at disse var


rester av influxen. Februarfunnene var som følger: 2 ind. Herdla, As. 6.2 (ENA), 8 ind. s.st. 12.2 (EFR,DGJ,OMO), 3 ind. Hegglandsdalen, Os 16.2 (BLO) og 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 22.2 (THH). I desember hadde vi følgende funn: 6 ind. Herdla, As. 2.12 (HSA). 14 ind. s.st. 3.12 (EFR). 3 ind. Stend, Be. 5.12 (O.Flesland). 3 ind. Kollsnes, Øyg. 7.12 (KPG). 6 ind. Herdla, As. 10.12 (THA).

### **Sandløper** *Calidris alba*

Alle funn: Vi tar først alle funn fra Herdla, As. 1 ad. 20.7 (ENA). 1 (1K) 17.8 (THA). 5 ind. 23.8 (FFA). 10 ind. 24.8 (ENA). 7 ind. 25.8 (JDJ,EFR,THA,OMO). 6 1K 27.8 (FFA). 2 ind. 30.8 (EFR,GJE,OMO). 1 1K 14.9 (ENA,IFR). 1 ind. 26.9 (FFA,GHÖ). 1 1K 2.10 (IFR,MFR,ATM). 1 ind. 12.10 (IFR,MFR). Andre funn var; 48 S Hiskjo, Bømlo 25.8 (JKJ) og 2 S Skogsøy, Øyg. 29.9 (JBE).

### **Dvergsnipe** *Calidris minuta*

Uvanlige lokaliteter: 42 1K Herdla, As. 27.8 (FFA m.fl.). Ingen uvanlig lokalitet, men en bra rastende flokk til å være i Hordaland.



Figur 1: Antall individer (n=488) av vipe *Vanellus vanellus* fordelt på kommuner i Hordaland i perioden 13. til 23. januar 2005.

**Temmincksnipe** *Calidris temminckii*

Alle funn utenfor hekkeområdene: 1 ind. Garen, Eidfjord 15.5 (ATM). 2 ind. s.st. 28.5 (IMÅ). 1 1K Gjenesmoen, Voss 20.8 (OHE). 1 ad. Lotatraet, Voss 23.8 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 8.9 (EFR,OMO).

**Tundrasnipe** *Calidris ferruginea*

November til juli: Ingen funn i perioden men vi tar med årets største ansamling som var 31 ind; 29 1K + 2 ad. Herdla, As. 27.8 (FFA).

**Myrsnipe** *Calidris alpina*

Ansamlinger og vinterfunn: 200 ind. Herdla, As. 24.8 (ENA) og 250 s.st. 27.8 (FFA m.fl.). Herdla hadde også en del individer i januar med 5 ind. 14.1 (MJO,OMO). 6 ind. 15.1 (EFR). 5 ind. 22.1 (IGR m.fl.). 1 ind. 23.1 (IFR,MFR,THA).

**Brushane** *Philomachus pugnax*

Utvalgte funn: Årets største ansamling var 275 ind. Herdla, As. 27.8 (FFA m.fl.).

**Kvartbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

Alle funn: 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 14. & 16.1 (JBE). 1 ind. Morland, Fjell 20.3 (IFR,MFR). 1 ind. Rekvesøyane, Voss 28.3 (OHE). 2 ind Gjemesmoen, Voss 30.3 (OHE). 1 ind. Ulvikpollen, Ulvik 10.4 (OHE). 1 ind. Sandvin, Odda 28.4 (IMÅ). 2 ind. Herdla 1.10 (THA). 1 ind. s.st. 2.10 (IFR,MFR,ATM). 2 ind. Stormark, Fedje 6.10 (IMÅ,RVO). 1 ind. s.st. 7.10 (FFA,IMÅ,RVO). 5 ind. s.st. 9.10 (ABR,FFA,GHÖ). 7 ind. Herdla, As. 12.10 (IFR,MFR), 1 ind. Kollsnes, Øyg. 13.10 (KPG). 2 ind. Stormark, Fedje 15.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). 2 ind. Herdla, As. 15.10 (BAN,THA,GJE). 1 ind. Tintrabrua, Voss 18.10 (OHE). 1 ind. Stormark, Fedje 19.10 (FFA). 1 ind. Herdla, As. 22.10 (EFR). 1 ind. Sandvin, Odda 28.10 (RVO). 1 ind. Herdla, As. 19.11 (ENA,JOP,OMO). 3 ind. s.st. 6.12 (OMO). 1 ind. Tveitevannet, Be. 10.12 (OMO). 1 ind. Herdla, As. 18.12 (THA,OMO). 1 ind. Søfteland, Os 31.12 (BAN,THA).

**Enkeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Desember til februar: 2 ind. Herdla, As.

2.1-12.2 (BAN,THA,EFR,m.fl.). 3 ind. s.st. 15.-25.2 (OMO). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 3.1-14.1 (JBE). 4 ind. s.st. 16.1 (JBE). 1 ind. Svellingen, Øyg. 15.1 (ENA,OHE). 1 ind. Hjelme, Øyg. 19.1 (JBE). 3 ind. Herdla, As. 2.12 (HSA). 8 ind. s.st. 10.12 (THA). 2 ind. Tveitevannet, Be. 17.12 (HSA). 4 ind. Herdla, As. 18.12 (THA,OMO). 1 ind. Gåsland, Bømlø 19.12 (LØK). 2 ind. Sævarhagsvikjø, Stord 25.12 (THH). 1 ind. Hovaneset, Stord 25.12 (THH). 1 ind. Klppedalstjernet, Be. 26.12 (EGR). 2 ind. Alversund, Lindås 29.-31.12 (L.R.Fiske).

**Rugde** *Scolopax rusticola*

Desember til februar: 1 ind. Hjelme, Øyg. 1.1 (JBE). 1 ind. Hellesøy, Øyg. 2.1 (JBE). 1 ind. Vallahelene, Be. 2.1 (MFR). 1 ind. Flesland, Be. 16.1 (THA). 1 1K Hjelme, Øyg. (JBE). 1 ind. Kollsnes, Øyg. 25.1 (KPG). 1 ind. Slättekjøen, Stord 5.2 (THH). 1 ind. Lønningen, Be. 11.2 (THA). 1 ind. Tveita, Stord 19.2 (THH). 1 ind. Haugane, Fusa 26.2 (SSO). 1 ind. Vatnadalene, Stord 27.2 (THH). 1 ind. Storetveit, Be. 2.12 (OMO). 1 ind. Herdla, As. 2.12 (HSA). 1 ind. Kollsnes, Øyg. 5.12 (KPG). 1 ind. Myrdal, Be. 26.12 (ABJ). 3 ind. Storavatnet, Bømlø 30.12 (GOL).

**Svarthalespove** *Limosa limosa* [49/90-7/16]

Alle funn: Vi begynner med de funn som er underartsbestemt til *L.l.islandica* 1 1K Herdla, As. 23.8\* (F) (FFA)\*, 2 ind. s.st. 25.8\* (F) (DGJ,THA) og 7 ind. s.st. 30.8\* (EFR,GJE,OMO). 2 1K s.st. 3.9\* (F) (BAN,GJE,ATM). 1 1K s.st. 6.9\* (F) (ABR,FFA). 1 1K Nordnes, Be. 7.-9.9\* (F) (K.Ekeli,ABR,FFA). 1 1K Herdla, As. 14.9 (ENA,IFR). 1 1K s.st. 25.-28.9\* (DGJ,FFA,GHÖ,m.fl.). 2 1K s.st. 27.9\* (F) (FFA). Funn av fugler som ikke ble underartsbestemt var: 1 ind. sammen med to lappspover Kollsnes, Øyg. 31.8\* (KPG). 2 S s.st. 1.9\* (KPG). Dette var en meget god høstopptreden i Hordaland. Det er vanskelig å vurdere hvor mange forskjellige fugler det har vært snakk om, men vi vurderer det til minst å ha dreid seg om 16 individer fordelt på sju funn.



Den islandske hekkebestanden av svarthalespove *Limosa limosa islandica* har økt de siste åra (Gunnarsson et. al. 2005). Dette synes å ha resultert i flere observasjoner hos oss også, og i 2005 ble hele 16 ind. observert i Hordaland. Ungfuglen som her er avbildet er av den islandske underarten, noe brorparten av funnene i fylket trolig er. Denne fuglen holdt seg på plenen utenfor Akvariet i Bergen 7. til 9. september 2005. Foto: Frode Falkenberg.

### Lappspove *Limosa lapponica*

November til juli: Alle funn er gjort på Herdla, As. 2 ind. 14.-15.1 (MJO,OMO,EFR). 1 ind. 22.1 (IGR). 3 ad. M 20.7 (ENA). 1 1K 19.-20.11 (ENA,JOP,OMO m.fl.).

### Småspove *Numenius phaeopus*

Utvalgte funn: 1 ind. Rekvesøyane, Voss 13.4 (OHE) er en tidlig observasjon, mens 65 ind. Herdla, As. 20.4 (DGJ), var årets største ansamling i fylket.

### Storspove *Numenius arquata*

Desember til februar: 1-2 ind. Solberg, Øyg. 14.1 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 15.1 (EFR). 2 ind. Hovland, Bømlo 18.1 (RHO). 1 ind. Rong, Øyg. 19.1 (JBE). 3 ind. Breivik, Øyg. 19.1 (JBE). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 15-20.1 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 22.-23.1 (GJE,OMO m.fl.).

### Sotsnipe *Tringa erythropus*

Alle funn: 4 ind. Herdla, As. 14.6 (EFR). 1 1K Golten, Sund 6.8 (EFR). 1 ind. Herdla, As. 6.8 (BAN,THA,OMO). 2 ad. Tjeldstø, Øyg. 7.8 (JBE). 1 ind. Gaupåsvannet, Be. 8.8 (EFR). 2 ind. Herdla, As 13.8 (THA). 1 ind. Kjøl, Bømlo 19.8 & 22.8 (OHA). 1-2 1K Herdla, As 24.8 (ENA). 2 1K s.st. 25.8 (JDJ,EFR,m.fl.). 2-3 ind. s.st. 27.08 (FFA). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 30.8 (JBE). 1 1K Herdla, As. 30. 8 (EFR,GJE,OMO). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 1.9 (JBE). 1 ad. Herdla, As. 25.-28.9 (GHA,ENA). 1 S Kirkevågen, Fedje 1.10 (FFA,ENA). 2 ind. Herdla, As. 12.10 (IFR,MFR). De tre siste funnene representerer meget seine funn i fylket. Oktober er en og en halv måned etter normal trekktopp for arten.

### Rødstilk *Tringa totanus*

Utvalgte funn: Eneste vinterobservasjon var 1 ind. Herdla, As. 12.2 (HSA). 1 ind. Kjøl, Bømlo 3.4 (OHA,LØK), var årets første trekker.

### Skogsnipe *Tringa ochropus*

Alle funn: 1 ind. Sandvin, Odda 4.4 (IMÅ). 1 ind. s.st. 20.4 (IMÅ). 2 ind. Herresåsen, Voss 16.5 (OHE). 2 ind. Langvassmyra, Eidfjord 30.7 (IMÅ). 1 ind. Kjøl, Bømlo 30. 7 (OHA). 1 ind. Hatten, Øyg. 5.8 (JBE). 1 ind Vetle Grungavatnet, Voss 14.8 (OHE). 1 S Vinappen, Fedje 21.8 (ABR,JDJ,FFA m.fl.). 2 ind. Herdla, As. 27.8 (FFA).

### Grønnstilk *Tringa glareola*

Alle funn: 1 ind. Garen, Eidfjord 3.6 (TLI). 1 par Bjoreidalen, Eidfjord 2.7 (FST). 3 ind. Herdla, As. 3.8 (JDJ). 1 ind. Kjøl, Bømlo 20.8 (OHA). 1 ind. Herdla, As. 3.-6.9 (GJE,ATM,ABR,FFA). 1 ind. s.st. 8.9 (EFR,OMO). 1 1K s.st. 14.9 (ENA,IFR).

### Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Oktober til medio april: 1 ind. Låte, Odda 13.1\* (BJA). 1 ind. Voss Vandrarrhjem, Voss 17.4 (OHE). 1 ind. Kræmmerholmen, Fedje 15.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). Januarfunnet fra Odda var første vinterfunn i Hordaland.

### Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Alle funn: 4 ind. Isdalen, Eidfjord 29.5 (ATM). 1 ind. Garen, Eidfjord 29.5 (ATM). 5 ind. Tinnhølen, Eidfjord 26.6 (JOP). 13 ind. Langvassmyra, Eidfjord 10.7 (IMÅ). 1 1K Herdla, As. 8.8 (GJE).

### Polarjo *Stercorarius pomarinus* [50/170-7/46]

Alle funn: Alle vårfunn er nordtrekkende forbi Skogsøy, Øyg. i mai; 4 2.5 (JBE), 2 5.5 (JBE), 7 6.5 (JBE,HTO), 16 10.5 (JBE,HTO), 13 19.5 (JBE). Høstens funn er alle søtrekkende forbi Hiskjo, Bømlo med 1 lys ad. 22.8 (JKJ), 3 ind. (2 lysfaset + 1 mørk) 25.8 (JKJ).

### Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Alle funn: Alle vårfunn er nordtrekkende forbi Skogsøy, Øyg.; 2 30.4 (JBE), 1 5.5



(JBE), 6 (alle mørkfasete) 6.5 (JBE,HTO), 37 10.5 (JBE,HTO), 1 12.5 (JBE), 4 14.5 (JBE), 13 19.5 (JBE), og 1 30.7 (JBE). Øvrige funn er 1 mørkfaset Hjeltefjorden, Øyg. 1.8 (JBE). 2 ind. Skogsøy, Øyg. 5.8 (JBE). 1 S mørkfaset Hiskjo, Bømlo 25.8 (JKJ). 1 S Skogsøy, Øyg. 2.9 (JBE). 1 1K Herdla, As. 8.9 (EFR,OMO). 1 N Skogsøy, Øyg. 9.9 (JBE). 1 juv + 1 ad. S Skogsøy, Øyg. 24.9 (ATM). 1 S Hjeltefjorden, Øyg. 27.9 (JBE).

### **Storjo** *Stercorarius skua*

Alle funn: Samtlige funn er trekkende individer forbi Skogsøy eller Hiskjo. Vi begynner med Skogsøy, Øyg. 1 N 12.4 (JBE), 1 S 30.4 (JBE), 3 S 1.5 (BAN,MFR,THA), 1 N 5.5 (JBE), 1 N 6.5 (JBE,HTO), 2 N 10.5 (JBE,HTO), 3 N 12.5 (JBE), 3 N + 2 S 14.5 (JBE), 4 N 19.5 (JBE), 1 S 21.7 (JBE), 2 S + 5 N 30.7 (JBE,JDJ), 6 S 5.8 (JBE), 2

S 28.8 (ENA,THA), 5 S 24.9 (ATM), 5 S 29.9 (JBE), 1 S 2.10 (JBE,JDJ). Deretter forbi Hiskjo, Bømlo; 2 S 16.8 (JKJ,A. Knutsen,S.Roth), 12 S 22.8 (JKJ), 1 S 23.8 (JKJ), 29 S 25.8 (JKJ).

### **Dvergmåke** *Larus minutus* [20/28-3/3]

Alle funn: 1 2K Kvassnestemma, Lindås 21.-26.2\* (F) (O.Moen m.fl.), 1 2K Fleslandsskjæret, Be. 10.3\* (THA). 1 1K S Herdla, As. 3.9\* (ATM). 2003: 2 1K Nordmannslågen, Eidfjord 7.-8.8\* (ATM). Lindåsfuglen representerer bare det andre vinterfunnet av arten i Hordaland.

### **Ringnebbmåke** *Larus delawarensis* [14/14-0/0]

Alle funn: Den adulte gamle traversen var tilbake til sin 12. overvintring i Byparken, Be. Fuglen ble sett 26.1, 29.1, 15.2, 19.2, 22.2, 23.2 og 2.3 (FFA,DGJ,m.fl.) Deret-

*Dvergmåke* *Larus minutus* i sin første vinterdrakt på Kvassnesstemma, Lindås 22. februar 2006. Fuglen var på lokaliteten fra 21. til 26. februar, og representerer bare det andre vinterfunnet av arten i Hordaland. Foto: Ola Moen / [www.fjordimages.com](http://www.fjordimages.com)





Denne 2K grønlandsmåken *Larus glaucooides* skapte en del hodebry med sitt noe polarmåkeliggende utseende mens den var i Bergen i perioden fra 9. januar til 26. mars (fotografert 25. januar). Merk bl.a. de korte beina, nebbets form og farge og svingfjærprojeksjon, karakterer som taler mot polarmåke. Foto: Frode Falkenberg.

ter dukket den opp igjen til sin 13. overvintring igjen i Byparken, Be. 6. og 20.12 (FFA,ABR). Funnene er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

#### **Fiskemåke** *Larus canus*

Utvalgte funn: 1915 ind. N [kl. 7:00-10:30] Skogsøy, Øyg. 2.4 og 2025 N s.st. 12.4 (JBE). 1000 S Skogsøy, Øyg. 16.10 (ATM,K.Tvedt).

#### **Sildemåke** *Larus fuscus*

November til medio mars og *Larus fuscus* graellsii: 1 ad. Nygårdsparken, Be. 11.3 (FFA,GHÖ). 1 ind. Kilstraumen, Austrheim 11.3 (HBJ). Alle funn av individer som viser karakterer som peker mot graellsii (britisk sildemåke): Alle funn av denne underarten ble gjort på Herdla, As.: 1 ad. 28.3-16.4\* (F) (MFR,THA m.fl.). 1 ad. 22.5\* (F) (ABR,FFA,GHÖ).

#### **Grønlandsmåke** *Larus glaucooides* [32/33-2/2]

Alle funn: 1 2K Byparken, Bergen 9.1-26.3\* (F) (KTO,ATM m.fl.). 1 2K S Skogsøy, Øyg. 22.1\* (JBE).

#### **Polarmåke** *Larus hyperboreus*

Alle funn: 1 2K Rong, Øyg. 9.1 (MFR). 1 ad. Alvheim, Øyg. 9.1 (JBE). 1 2K Tjeldstø, Øyg. 14.1 (JBE). 1 2K Ågotnes, Fjell 15.1 (IFR,MFR,THA m.fl.). 1 2K Herdla, As. 15.1 (EFR). 1 2K Tjeldstø, Øyg. 20.1 (JBE). 1 2K Skogsøy, Øyg. 22.1 (JBE). 1 2K Herdla, As. 22.1 (IGR,GJE,OMO). 1 2K Kviturspollen, Be. 29.1 (THA). 1 2K funnet død Herdla, As. 12.2 (EFR,DGJ,OMO m.fl.). 1 ind. Solheimsvannet, Be. 13.2 (GJE). 1 2K Bontelabo, Be. 16.2-2.3 (JDJ,THA). 1 2K Kårtveitpollen, Fjell 3.3 (JDJ). 1 2K Herdla, As. 22.3-17.4 (BAN,MR,THA m.fl.). 1 2K

Hiskjo, Bømlo 17.10 (LØK). 1 2K Stora-  
vatnet, Bømlo 26.10 (LØK), som trolig er  
samme ind. som på Hiskjo 17.10.

#### **Makrellterne** *Sterna hirundo*

Utvalgte funn: 1 ind. Grandane, Voss 15.6  
(OHE). En knapt årlig art på Voss.

#### **Rødnebbterne** *Sterna paradisaea*

Utvalgte funn: 1 1K Grandane, Voss 10.8  
(OHE).

#### **Alkekonge** *Alle alle*

Innlandsfunn: 1 ind. Måge, Ullensvang  
29.10 (Å.L.Førde).

#### **Lunde** *Fratercula arctica*

Hekkefunn: Ingen hekkefunn rapportert  
i 2005, men 1 ind. Sentrum, Odda 20.11  
(STR,RVO) var første funn i Odda kom-  
mune!

#### **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto*

Innlandsfunn: 1 ind. Haugamoen, Voss  
17.10 (OHE).

#### **Snøugle** *Bubo scandiaca* [3/3-2/2] etter 1990

Alle funn: 1 M Fjæra, Etne 18.4\* (ALA),  
1 F Store Bjoreinuten, Eidfjord 25.6\*  
(K.Tarlebø). De første funn i fylket siden  
invasjonen i 2000, da to fugler ble sett hos  
oss.

#### **Haukugle** *Surnia ulula*

Alle funn: 1 ind. Lofthus, Ullensvang  
16.10 (STR). 1 ind. Kinsarvik, Ullensvang  
4.11 (ISA,R.Lillevik). Det kan muligens  
dreie seg om samme fugl ved de to anled-  
ningene.

#### **Spurveugle** *Glaucidium passerinum*

Alle funn: 1 ind. ved foringsplass Vallahei-  
ene, Be. 30.12.2004-2.1 (B.Wang). 2 ind.  
Svelgane, Voss 25.3-15.4 (DGJ,m.fl.).

#### **Hornugle** *Asio otus*

Alle funn: 1 ind. Solberg, Øyg. 15.11 (JBE).  
Fuglen var død og ikke forsk. Hornugla har  
utviklet seg til å bli en meget fåtallig art i  
Hordaland.

#### **Jordugle** *Asio flammeus*

Alle funn: 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 24.3  
(BAN,JBE,MFR,THA). 1-2 ind. Skogsøy,  
Øyg. 28.4 (JDJ). 1 ind. Bjoreidalen, Eid-  
fjord 28.5 (IMÅ). 1 ind. Varden, Fedje  
8.10 (MFR m.fl.). 1 ind. Skogsøy, Øyg.  
16.10 (ATM,K.Tvedt).

#### **Perleugle** *Aegolius funereus*

Alle funn: 1 sy. Svelgane, Voss 11.3  
(ATM,OHE).

#### **Hærfugl** *Upupa epops* [40/40-1/1]

Alle funn: 1 ind. Herdlevær, Øyg. 24.9\*  
(F) (ENA).

#### Vendehals *Jynx torquilla*

Alle funn: 1 ind. Christieparken, Be. 5-  
14.5 (FFA,MOL). 1 sy. Grauo, Voss 13.6  
(ATM).

#### **Tretåspett** *Picoides tridactylus* [12/12- 1/1]

Alle funn: 1 M Espelandsmarka, Odda  
31.12\* (IMÅ). Det foreligger kun 12 tid-  
ligere funn av arten i Hordaland, og dette  
var første funn siden en fugl ble sett på  
Voss i april 2001.

#### **Dverglerke** *Calandrella brachydactyla* [6/6-1/1]

Alle funn: 1 ind. Stormark, Fedje 16.10 (F)  
(JDJ,OHE,KTO,RVI). Andre funn på Fed-  
je, der det første stammer fra 27.10.2001.  
Funnene er innsendt, men ikke ferdigbe-  
handlet av NSKF.

#### **Sanglerke** *Alauda arvensis*

Medio november - januar: 5 ind. Herdla,  
As. 2.12 (HSA). 1 ind. Flesland gård, Be.  
11.12 (THA). 3 ind. Herdla, As. 18.12  
(THA,OMO).

#### **Fjellerke** *Eremophila alpestris*

Trekk: 3 S Kollsnes, Øyg. 12.10 (KPG). 1  
ind. Stormark, Fedje 22.10 (FFA), var bare  
andre funn på Fedje.

#### **Låvesvale** *Hirundo rustica*

Medio oktober - mars: Ingen funn i peri-  
oden, men vi tar med 3000+ på overnat-  
ningsplass i Purkebolsvannet, Austrheim  
1.9 (TSV).



Årets eneste hørfugl *Upupa epops* var denne fuglen som var på Herdlevær i Øygarden 24. september 2005. Foto: Eirik Nydal Adolfsen.

**Tartarpiplerke** *Anthus richardi* [60/88-9/15]

Alle funn: 1 ind. Herdla, As. 24.9\* (JDJ). 1 ind. Losstasjonen, Fedje 2.10\* (FFA). 4 ind. Herdla, As. 1.-2.10\* (F) (THA,IFR,MFR,ATM). 4 ind. Langøyini, Austrheim 6.10\* (FFA). 1 S Skogsøy, Øyg. 8.10\* (JBE). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 14.10\* (JBE). 1 S Herdlevær, Øyg. 15.10\* (FFA). 1 ind. Herdla, As. 21.10\* (ENA). 1 ind. Herdla, As. 22.10\* (EFR), var trolig en ny fugl. Den beste opptreden av arten i Hordaland noensinne!

**Heiipielerke** *Anthus pratensis*

Desember - februar: 1 ind. Herdla, As. 6.-12.2 (ENA,EFR,DGJ,m.fl.). 1 ind. Oterø, Austevoll 2.12 (IFR). 4 ind. Herdla, As. 2.-18.12 (THA,OMO,HAS). 3 ind. s.st. 30.12 (BAN,THA).

**Skjærpielerke** *Anthus petrosus*

Utvalgte funn: Noen vinteransamlinger fra

Herdla, As. 12 ind. 25.1 (ABR,FFA,GHÖ), mens 30 ind. 12.3 (NOF Bergen) og 75+ ind. 22.3 (BAN,FHP), er vårtrekkere som har ankommet. Ellers tar vi med 1 ind. Grandane, Voss 10.10 (OHE), da arten er en sjelden gjest i Voss kommune.

**Gulerle** *Motacilla flava*

Alle funn: 1-2 ind. Garen, Eidfjord 14.5 (ATM). 3 ind. Maurseth, Eidfjord 14.5 (ATM). 3+ ind. Garen, Eidfjord 21.5 (IMÅ,STR,RVO). 1 ind. Herdla, As. 22.5 (ABR). 1 F Grandane, Voss 25.5 (OHE) og 3 ind. særle s.st. 26.5 (OHE). 2 M + 1 F Garen, Eidfjord 3.6 (TLI). 1 par varslet Liseth, Eidfjord 4.6 (TLI). 6 M + 2 F Isdalen, Eidfjord 4.6 (TLI). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 19.6 (JBE). Høsten innledes med 35+ ind; 25 ringmerket Garen, Eidfjord 3.-4.8 (ATM). Deretter er det Voss med 2 1K Rekvessøyane 24.08, 3 1K Gjernesmoen 24.8, 1 ind. Haugamoen 25.8, 1 ind. Grandane 25.8, 1 1K Grandane 30.8, og 1 ind. Gjer-

nesmoen 7.9 (alle funn av (OHE). Andre høstfunn: 6 ind. Maurset, Eidfjord 28.8 (DGJ). 1 ind. Sandvin, Odda 12.9 (IMÅ). 2 ind. Herdla, As. 16.10 (OWJ).

### **Vintererle** *Motacilla cinerea*

Alle funn: Artens fremgang i Hordaland fortsetter med en stadig økende funnmengde. Arten ble observert i alle årets måneder unntatt januar. Funnene ramses i det følgende opp kommunewis. Bergen: 1 ind. Byparken 26.2 (HSA), 1 ind. Store Nesttunvann 25.3 (GKJ), 1 ind. Eidsvåg 1.-13.4 (R.Hjelmeland,IFR), 2 ind. Skjenavann 6.4 (THA), 1 par (hekking påvist) Arnaelva 16.4-5.5 (GBJ), 1 ind. Nesttunnelven 6.5 (DSH), 1 ind. Hop 10.5 (RVI), 1 M Nordvik 13.5 (TSI), 1 ind. varslede Fanaelva 16.5 (OOV), 1 ind. Flesland 9.10 (THA) og 1 ind. Bergen storsenter, Be. 26.11 (ATM). Askøy: 1 ind. Herdla 10.-30.12 (THA m.fl.). Eidfjord: 1 ind. Eio (nedre del) 31.3 (ATM), 1 ind. Øvre Eidfjord 1.-3.4 (ATM), 2 ind. Øvre Eidfjord 16.9 (ATM), 1 ind. s.st. 10.-11.10 (ATM), ringmerket 11.10. Etne: 1 ind. Gjelmervik 23.3 (OHE), 2 ind. Etneosen 3.9 (RVO,IMÅ), 1 ind. Øyane 29.12 (THÅ). Granvin: 1 par hekker Hyrpo 14.6 (OOV). Odda: Enkeltindivider obs. Grønnsdal 30.3 (ALA), Sandvin 3.4 (IMÅ), Vetrhus 26.5 (IMÅ,RVO), Sandvin 31.8 (RVO), Egnehjem 1.7-4.9 (ALA), Sandvin 12.9 (IMÅ), 3 ind. Sandvin 29.9 (IMÅ). Ullensvang: 1 ind. Bleie 7.4 (O.Askeland), 1 ind. Aga 30.12 (IMÅ). Ulvik: 1 ind Bruravik 4.4 (ATM). Øygarden: 3 S Tjeldstø 27.7 (JBE), 1 ind. Tjeldstø 6.8 (JBE), 1 S Herdlevær 11.10 (KPG), 1 S Skogsøy 15.10 (ATM), 1 S Skogsøy 5.11 (JBE), 1 S 7.11 Tjeldstø (JBE). Voss: Arten har utvilsomt sitt kjerneområde på Voss. Første obs. er 1 ind. på Grandane 13.3, deretter observeres arten på følgende lokaliteter gjennom hekkeseongen, Gjernesmoen, Vosso, Bergesgrovi, Grandane, Haugo, Rekvesøyane, Mossefinelva, Skorve, Bordalsgjelet og Rekve. Deretter observeres arten utover hele høsten fram til 11.12 på diverse lokaliter som Gjernesmoen, Grandane, Rekvesøyane, Haugo, Rognsfossen og Tintrabrua. Største ansamlinger er 8-9 ind. stort sett 1K

på Gjernesmoen 20.8 (OHE), 7 ind 5 (1K) 2 ad. Gjernesmoen 24.9 (OHE), 5 (1K) Gjernesmoen 14.10 (OHE). Selv om arten sannsynligvis hekker på de fleste lokaliteter der den observeres gjennom hekkeseongen er det kun innrapportert ett konkret hekkefunn: 1 par foret unger Skorve 29.5 (OOV,TBR).

### **Linerle** *Motacilla alba*

November - februar: 1 ind. Gåsland, Bømlo 28.10 (LØK). 1 ind. Sentrum, Odda 25.11-7.12 (RVO).

### **Svartryggerle** *Motacilla alba yarrellii*

Alle funn: 2 M Breivik, Øyg. 21.3 (IFR,MFR). 1 M Herdla, As. 22.-27.3 (BAN,S.Sondbø). 1 M Tjeldstø, Øyg. 23.-25.3 (JBE). 1 M Herdlevær, Øyg. 24.3 (BAN,MFR,THA). 7 ind. 4 M + 3 F Herdla, As. 28.3 (MFR,THA). 1 M Gåsland, Bømlo 29.3 (LØK). 1 ind. Flesland Flyplass 1.4 (NTL). 1 M Herdlevær, Øyg. 2.4 (JBE). 1 M Sandvin, Odda 4.4 (RVO). 2 ind. Herdla, As. 9.4 (KTO). 1 F Haugo, Voss 28.4-2.5 (OHE). 1 M Herdlevær, Øyg. 2.5 (JBE). 1 M Låte, Odda 26.5 (IMÅ,RVO). 1 M Herdla, As. 8.9 (EFR,OMO). 1 M Herdlevær, Øyg. 17.9 (IFR,MFR,THA,ATM). 1 ind. Herdlevær, Øyg. 11.10 (KPG).

### **Sidensvans** *Bombycilla garrulus*

Alle funn: Etter rekordhøsten 2004 var det relativt få etterslengere i januar 2005, kun med et par observasjoner i Fusa og Odda i begynnelsen av måneden. 1 ind. på Ulriken, Bergen 14.5 (OSÆ) var sommerens eneste før høstens første dukket opp 14.10 med 62 ind. i Øygarden (IFR,MFR), 13 ind. på Stord (THH) og 12 ind. i Lindås (MWI). Deretter viste svansene på ny en fin opptreden i en relativt konsentrert periode med en topp i månedsskiftet oktober-november. Maxnotering var 385 ind. (330S+55N) på trekk ved Herdlevær, Øygarden, 5.11 (ATM,ENY,JBE), og 120 ind. Nedre Økland, Stord, samme dag (THH). Kommunevis fordeling ut året ble slik: Bergen (136), Bømlo (91), Eidfjord (104), Fedje (1), Fjell (9), Fusa (20), Kvam (27), Lindås (20), Odda (50), Stord (148), Voss (113) og Øygarden (547).



Denne svartrødstjerten *Phoenicurus ochruros* fra Golten i Sund kommune 5. november 2005, var en av fem individer i Hordaland i år. Foto: Jørn Opsal.

### **Jernspurv** *Prunella modularis*

Medio november - medio mars: 1 ind. ble sett på Leite, Bømlø, på foringsplass 9.-11.12 (GOL), og 1 ind. ble sett i samme område 23.-28.12 (GOL)

### **Blåstrupe** *Luscinia svecica*

Oktober – april, trekk: 1 M ble sett i Isdalen, Eidfjord 11.5 (ATM) og 2 sy. ind. var på Garen, Eidfjord 13.5 (ATM). På høsten ble 1 1K sett på Garen 13.8 (ATM), og 6 ind. ble sett på Voss fra 14.8-15.9, deriblant 1 ad. M på siste dato (OHE). 2 ind. var også på Herdla 28.8 (AHÅ m.fl.).

### **Svartrødstjert** *Phoenicurus ochruros* [30/34-5/5]

Alle funn: Årets første var en F på Golten, Sund, 9.4\* (EFR), deretter ble det sett en F ved Varberghaugen, Eidfjord, 21.4\* (ATM). På høsten ble det sett ett ind. ved Hellesøy, Øygarden\* (F) (ATM,ENY),

og 1-2 ind. ved Golten, Sund\* (F) (JOP), begge observert 5.11. 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 16.11\* (JBE). Med 30 funn i Hordaland fra før må fem ind. på ett år sies å være bra.

### **Svartstrupe** *Saxicola torquata* [38/60-3/10]

Alle funn: Årets første var en hann ved Ågotnes, Fjell, 27.2-28.3\* (F) (MFR,THA m.fl.). Fra 24.3 var fuglen syngende på det som tidligere har vært en hekkelokalitet for arten. Fra 7.-12.4 var det en M på Sandvin, Odda\* (F) (RVO, ALA), mens en F dukket opp på Eldøy, Stord 14.4\* (F) (THH). Høstens forekomst var konsentrert til Lauvøyeni i Austrheim kommune. Der ble det sett 8 ind. på ulike lokaliteter 6.10\* (F), og 19.10 ble det sett en M og en F s.st. (FFA). Arten kan muligens ha hekket i området. Fuglen fra Ågotnes regnes som den samme som oppholdt seg der i november, mens resten er nye fugler i funnmassen.



*Svartstrupe Saxicola torquata på Lauvøyni i Austrheim 6. oktober 2005. Fuglen var faktisk en av hele åtte individer på denne lille øya denne dagen. Kan arten ha hekket i nærområdet i år? Foto: Frode Falkenberg.*

### **Gråtrost** *Turdus pilaris*

Utvalgte funn: 60 ind. på Nedre Økland, Stord 12.2 (THH) var en stor ansamling så tidlig. Store høstforekomster som kan nevnes er 10580 sørtrekkende ind. på to timer ved Grandane, Voss, 23.10 (OHE). 10000 ind. ble også sett på Herdlevær, Øygarden, 5.11 (ATM,JBE,ENY), hvorav 9000 var sørtrekkende. 13000 ind. trakk sør ved Grandane, Voss, 6.11 (OHE), og i Bordalen, Voss, 12.11 var 12000 ind. til stede (OHE).

### **Rødvingetrost** *Turdus iliacus*

Ansamlinger desember - februar: 15 ind. var ved Nedre Økland, Stord 2.1 (THH), og 11 ind. var ved Tjeldstø, Øygarden 14.1 (JBE). Tidlig i desember ble det sett flere

ansamlinger, hovedsaklig i Bergen kommune, men 130 ind. fra Herdla, Askøy, 18.12 må trekkes frem (THA,OMO).

### **Duetrost** *Turdus viscivorus*

Alle funn: Årets første var ved Kalandsviken, Bergen, 20.3 (JDJ). I ukene fremover var det som vanlig Øygarden som stakk av med de fleste funnene, åtte totalt. Odda viste også en fin forekomst med 6 ind, hvorav ett av disse satt og sang på Låte 1.5 (RVO). Ellers ble det rapportert 2 ind. Sima, Eidfjord 23.4 (ATM), og 2 ind. Gjernesmoen, Voss 28.4 (OHE).

### **Gresshoppesanger** *Locustella naevia* [65/69-3/4]

Alle funn: Årets mest spennende obser-

vasjon var et varslende par ved Telavåg, Sund, 9.6 (F) (EFR), som ytterligere underbygger de siste års signaler om hekking i Hordaland. Ett ind. sang ved Bjørdledalen, Bømlo, 15.7 (LØK), og ett ind. var ved Turøy, Fjell, 2.10\* (TLI).

**Myrsanger** *Acrocephalus palustris* [7/10-1/1]

Alle funn: Årets eneste var ett sy. ind. ved Lundarvatnet, Voss, fra 18.-19.6 (ECH,OHE).

**Møller** *Sylvia curruca* [139/162-10/11]

Alle funn: 1 sy. Jamnaheia, Bømlo 21.5 (GOL). 1 sy. 22.-25.5 ved Herdla, Askøy (ABR,GHÖ,FFA). 1 sy. Leite, Bømlo 24.5 (GOL). 1 sy. Gjernesmoen, Voss 1.6 (OHE). 1 sy. Garen, Eidfjord 4.6 (ATM). 1 sy. Jordbruksskolen, Voss 9.6 (OHE). 1 sy. Grauo, Voss 13.6 (ATM), og 1 sy ind. Rolfsnes, Bømlo, 19.6 (GOL). To mulige hekkefugler var på plass ved Tjeldstø, Øygarden fra 17.-28.7 (JBE). Høstens eneste ind. var på Husa, Fedje 1.10 (ENY).

**Hauksanger** *Sylvia nisoria* [26/29-4/4]

Alle funn: 4 ind. ble sett: 1K Haugamoen, Voss 30.8\* (OHE), var en ny art for kommunen. Deretter ble det sett 1 1K Våge, Fedje 8.10\* (FFA,ENY). 1 1K Kirkevågen, Fedje 8.10\* (FFA), og til slutt 1 1K Tjeldstø, Øygarden 9.10\* (JBE).

**Tornsanger** *Sylvia communis*

Oktober - april: Årets første var 1 sy. på Ågotnes, Fjell 20.4 (GJE). Funnet representerer ny ekstremitid for fylket.

**Hagesanger** *Sylvia borin*

Oktober - april: 2 ind. Koppen, Fedje 1.10 (FFA,ENY).

**Munk** *Sylvia atricapilla* [101/118-16/16]  
vinterfunn etter 1992

Medio november - medio april: 1 M Fredlundsvingen, Bergen, 12.-13.2 (A.Halvorsen), og 1 F Eldøy, Stord, 14.2 (THH). Årets første var 1 sy. ind. 24.4 ved Flesland, Bergen (THA). Den kommunevise fordelingen i desember var Bergen

*Vi opplevde et relativt dårlig år for mølleren Sylvia curruca i 2005 med kun 11 individer observert. Denne fugler stammer fra Garen i Eidfjord 4. juni 2005. Foto: Alf Tore Mjøs.*





(8 ind.), Bømlo (1 ind.), Eidfjord (1 ind.), Odda (1 ind.), Stord (1 ind.) og Øygarden (2 ind.).

**Gulbrynsanger** *Phylloscopus inornatus* [59/65-33/33]

Alle funn: Høsten 2005 viste en rekordstor forekomst av gulbrynsangere i hele landet. Årets første fugl var 1 ind. på Herdlevær, Øygarden, 21.9 (JBE). Fram til 17.10 var den kommunevise fordelingen som følger: Bergen (1 ind. Flesland 2.10\*; andre funn for kommunen), Fedje (10 ind.), Fjell (2 ind.), Lindås (1 ind.), Os (1 ind.) og Øygarden (18 ind.). Det foreligger trolig stor underrapportering fra Fedje, ettersom der ikke var dekning på de dagene med størst rush på sammenlignbare plasser, f.eks. Utsira. Det ble dessuten rapportert fugler (ca. 10-15 ind.) fra andre steder som dessverre ikke har kommet inn for behandling av komiteen. Uansett, dette er det beste året noensinne for arten i Hordaland, noe som også var tilfellet for Sør-Norge generelt.

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

November – mars: 2 ind. på Landro, Fjell 23.3 (ABR,GHÖ,FFA) var ny ekstremumstid for fylket. Like etter var 1 ind. på Herdlevær, Øygarden 25.3 (JBE). På høsten var 1 ind. på Sæle, Øygarden 11.11 (JBE), 1

ind. Haugamoen, Voss 12.11 (OHE), 1 ind. Tjeldstø, Øygarden 17.11 (JBE), 2 ind. Herdlevær, Øygarden 18.11 (JBE,JDJ) og 1 ind. Gåsland, Bømlo, 26.11 (LØK). De fleste var trolig av underarten *abietinus*, mens Tjeldstø-individet viste karakterer som peker mot et mer østlig opphav.

**Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

Nordlig underart, *P. t. acredula*: 6 ind. rm. (4 2K+ og 2 1K) Garen, Eidfjord i perioden 30.5 til 14.8\* (F) (ATM). Dette var de første dokumenterte funnene av den nordlige løvsangerunderarten i Hordaland. Full omtale og beskrivelse av fuglene kan leses i Mjøs (2006).

**Rødtoppfuglekonge** *Regulus ignicapilla* [1/1-1/1]

Alle funn: 1 hunn Kirkevågen, Fedje 1.10. Fuglen ble sett jevnlig fram til siste dato som var 9.10 (F) (FFA,ENY m.fl.). Det foreligger kun ett tidligere funn fra Hordaland. Det var en fugl som ble ringmerket på Hauge i Os 4. oktober 1987. Funnet er innsendt, men foreløpig ikke ferdigbehandlet av NSKF.

**Tornskate** *Lanius collurio*

Alle funn: Årets eneste funn var 1 ind. Sandvin, Odda, 28.8 (IMÅ).



Til tross for en betydelig underrapportering av gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* i år, ble summen av godkjente individer det beste noensinne i Hordaland med 33! Krabaten på bildet var en av over ti fugler som var innom Herdlevær i Øygarden denne høsten. Fotografert av Alf Tore Mjøs 15. oktober 2005.

En god kandidat til å bli årets (sjeldneste) fugl var denne rødtoppfuglekongen *Regulus ignicapilla* som oppholdt seg i Kirkevågen på Fedje i perioden 1. til 9. oktober 2005. Det forelå kun et tidligere funn fra Hordaland.

Foto:

Frode Falkenberg.



### Varsler *Lanius excubitor*

Alle funn: Årets første var 1 ind. Flesland, Bergen 14.1 (KPG). Alle øvrige funn var i høsthalvåret: 1 ind. Stormark, Fedje 16.10 (JDJ,OHE,KTO,RVI). 1 ind. Eknes, Lindås 19.10 (MWI). 1 ind. Isdalen, Eidfjord 23.10 (ATM). 1 ind. ved foringsplass Gåsland, Bømlo 24.10 (LØK). 1 ind. Gåsland, Bømlo 9.11 (LØK). 1 ind. Indre Sandviken, Bergen 7.12 (EGR). 1 ind. Flesland, Bergen 4.12 (THA). 1 ind. Hovden, Odda 25.12 (SKV). 1 ind. Dynjo, Sveio 26.12 (G.Apeland). 1 ind. Helleskår, Odda 31.12 (RVO).

### Kornkråke *Corvus frugilegus*

Alle funn: 1 ad Herdla, Askøy 1.-2.1 (DGJ). 1 ad Mindemyren, Bergen 1.-8.1 (GJE,DSH). 1 ind. Gåsland, Bømlo 16.1 (KKA). 1 2K Herdla, Askøy 29.1-25.2 (EFR m.fl.). 1 ad. St. Halvardsvei, Bergen 15.3 (FFA). 3 ind. Herdla, Askøy 22.3 (BAN,FHP). 1 2K Rådalen, Bergen 23.3 (THA). 1 ad Knarvik senter, Lindås 19.-26.3 (THA,ABJ). 1 ind. Herdla, Askøy 2.-9.4 (DGJ,GJE). 2 ind. Herdla, Askøy 16.4 (NOF Hordaland). 1 2K Herdla, Askøy 20.4 (DGJ). 1 ad. Brann Stadion, Bergen (TSH). 1 ad Tveita, Stord 5.11 (THH). 1 ad. Minde barnehage, Bergen 8.11 (HTO). 17 ind. er nøyaktig samme årstotal som for 2004, og er relativt bra.

### Svartkråke *Corvus corone* [67/72-4/4]

Alle funn: 1 ind. Herdla, Askøy 28.1-27.3\* (JDJ,ENY m.fl.). 1 ind. Stormark, Fedje 6.10\* (F) (FFA,ABR,ENA). 1 ind. Sele, Øygarden 15.10\* (FFA). 1 ind. Hellesøy, Øygarden 15.10\* (F) (FFA). 1 ind. Rubbestad, Bømlo 4.12 (OHA). 1 ind. Mosterhamn, Bømlo 29.12 (ROL). 1 ind. Herdlevær, Øygarden, 30.12 (JBE). En årstotal på 8-9 ind. er relativt bra, men flere av fuglene, bla. fra Fedje og Øygarden, kan være returnerende individer, og vi fører kun 4 ind. opp som nye i funnmassen.

### Ravn *Corvus corax*

Utvalgte funn: Årets største vinteransamlinger var begge ved Bjørke, Voss: 200+ ind. 26.12 og 240+ ind. 31.12 (OHE).

### Rosenstær *Sturnus roseus* [12/12-4/4]

Alle funn: 1 1K ble sett ved Stavland, Bømlo 2.9 (F) (OHA), og ble gjenoppdaget ved Gåsland, Bømlo 2 dager senere (KKA,LØK). 1 1K ble identifisert fra et fotografi av en stærflokk på Brattenborg, Fjell, 8.9 (F) (N.Brattenborg). 1 1K ble sett på Varden, Fedje 8.10 (F) (FFA m.fl.). 1 1K Skipshaugen, Fedje 15.10 (OHE). Med 3-4 individer ble 2005 et meget godt år for rosenstær i Hordaland. Funnene er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

### **Bjørkefink** *Fringilla montifringilla*

Utvalgte funn: 2500 ind. trakk sør forbi Kollnes, Øygarden på litt under to timer 12.10 (KPG)

### **Stillits** *Carduelis carduelis*

Alle funn: I løpet av første halvår ble det sett fugler på Askøy (2 ind.), i Fjell (4 ind.), Øygarden (12 ind.) og på Bømlo (42 ind.). Høstens første dukket opp 4.10 med 15 ind. på Tjeldstø, Øygarden (JBE). Deretter blir den kommunevis fordeling: Askøy (9), Bergen (6), Bømlo (48), Fedje (8), Lindås (4), Øygarden (21). Med totalt ca 180 individer er resultatet for 2005 bedre enn 2004 (140), men dårligere enn 2003 og 2002 (hhv. 261 og 323).

### **Tornirisk** *Carduelis cannabina*

November – mars, indre strøk: Årets første trekkobservasjon var 1 ind. på Tjeldstø, Øygarden 27.3 (JBE). Utover dette ble tornirisk registrert to ganger i Eidfjord kommune i august (ATM), hvor arten er relativt sjelden.

### **Polarsisik** *Carduelis hornemanni* [21/58-1/1]

Alle funn: 1 ad. Stormark, Fedje, 16.10\* (OHE). Første funn av arten i Hordaland siden 1999!

### **Grankorsnebb** *Loxia curvirostra*

Utvalgte funn: Årets største ansamling var 280 individer på trekk (220S og 60N) ved Herdlevær, Øygarden 5.11 (ATM,JBE,ENY). 16.10 og 15.10 trakk hhv. 240 og 210 ind. forbi samme lokalitet (ATM).

### **Rosenfink** *Carpodacus erythrinus* [28/34-2/2]

Alle funn: 1 ind. i Sæbø, Eidfjord 27.7\* (F) (ATM) var første funn i kommunen. Dessverre var det ingen rosenfinker i Myrkdalsdeltaet i 2005, etter at hekking ble påvist der i 2004. Trøsten får være en syngende ad M på Rekve, Voss 31.5\* (OHE)

### **Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

Utvalgte funn: Etter stor-invasjonen av østlige dompaper til Vest-Europa i 2004 var

det ganske overraskende at vi igjen skulle få høre fugler med trompet-lyd i 2005. 40 ind. trakk forbi Herdlevær, Øygarden 5.11 (ATM,ENY,JBE), og 40 ind. trakk forbi Grandane, Voss 6.11 (OHE).

### **Kjernebiter** *Coccothraustes coccothraustes*

Alle funn: I første halvdel var max-noteringen i Nygårdsparken, Bergen 8+ ind. 8.4 var der 1 sy. ind. (FFA m.fl.). Øvrige observasjoner: 1 ind. Eide, Odda 1.1 (IMÅ). 1 ind. Løyning, Odda 16.1 (I. Løyning). 1 ind. Låte, Odda 18.3 (K. Kvandal). 15 ind. på foring Tveiterås, Bergen 22.3 (AWA). 2 ind. Tjeldstø, Øygarden 30.3 og 1 ind. s.st. 31.3 (JBE). 1 ind. Blom, Øygarden 31.5 (KPG). Høstens første ind. var 1F ringmerket Øvre Eidfjord, Eidfjord 19.10 (ATM,J. Erck). 23.10 dukket 2 ind. opp i Nygårdsparken, Bergen. I siste halvdel av november økte antallet til 6+ ind., og i slutten av desember var max-noteringen 11 ind. (FFA m.fl.). 1 ind. var også på Løyning, Odda 6.11 (S.Kvam,IMÅ). 1 ind. Øvre Hageby, Stord 5.12 (RNY). 1 ind. Paradis, Bergen 31.12 (AHÅ).

### **Lappspurv** *Calcarius lapponicus*

Trekk og vinter: 3 ind. var på Herdla, Askøy 15.1 (EFR), noe som er en sjelden vinterobservasjon i Hordaland. De første trekkerne var 1 ind. Tælavåg, Sund 27.3 (TLI). 3 ind. Herdla, Askøy 28.3 (MFR,THA). 1 ind. Sandvin, Odda 18.4 (IMÅ m.fl.). På Garen i Eidfjord ble det sett flere rastende individer gjennom mai, og 13.5 var det 100 individer langs riksvegen på strekningen fra Garen til Halne (ATM). Første høstobservasjon var 1 ind. ved Skøgsøy, Øygarden 21.9 (JBE). I løpet av høsten ble det sett 5 ind. på Askøy, 3 ind. i Øygarden, 2 ind. på Fedje og 2 ind. i Austrheim. En total på 12 høstobservasjoner må sies å være lite for Hordaland, og skyldes nok lite dekning på de mange kystlokalitetene våre.

### **Dvergspurv** *Emberiza pusilla* [11/11-1/1]

Alle funn: 1 ind. Lauvøyeni, Austrheim, 6.10\* (FFA). Høsten 2005 var for øvrig et bra år for arten i Norge med over 40 rapporterte individer.

## Litteratur

- Falkenberg, F. (2005a). Den store hvitkinngåsdagen. [Internett] cyberbirding.no/nof/ 19. mai 2005. Tilgjengelig fra: [http://cyberbirding.uib.no/nof/nyheter/dato/?news\\_id=2005\\_20](http://cyberbirding.uib.no/nof/nyheter/dato/?news_id=2005_20)
- Falkenberg, F. (2005b). Vipenes flukt fra Inga. [Internett] www.fugler.no 18. januar 2005. Tilgjengelig fra: [http://www.fugler.no/smastykker/200502\\_vipe.htm](http://www.fugler.no/smastykker/200502_vipe.htm)
- Falkenberg, F. (2005c). Storskarv på Hardangervidda - hvilken underart?. [Internett] cyberbirding.no/nof/ 25. august 2005. Tilgjengelig fra: <http://cyberbirding.uib.no/nof/galleri/spesial/20050817.php>
- Gunnarsson, T., Gill, J., Petersen, A., Appleton, G. & Sutherland, W. (2005). A double buffer effect in a migratory shorebird population. *Journal of Animal Ecology* 74: 965-971.
- Hansen, T. (2005). Grønlandsjaktfalk på Herdla. [Internett] cyberbirding.no/nof/ 23. januar 2005. Tilgjengelig fra: [http://cyberbirding.no/nof/nyheter/dato/?news\\_id=2005\\_03](http://cyberbirding.no/nof/nyheter/dato/?news_id=2005_03)
- Mjøs, A.T. (2006). To underarter av løvsanger *Phylloscopus trochilus* i Hordaland. *Krompen* 35: 60-66.