

Fugler i Hordaland 2006



Frode Falkenberg, Eirik Nydal Adolfsen,
Michael Fredriksen og Oddvar Heggøy

Østlig ringgås Branta bernicla bernicla og hvitkinngås Branta leucopsis på Stormark, Fedje 10. oktober 2006. Østlige ringgjess hadde en rekordartet forekomst i Hordaland høsten 2006. Foto: Frode Falkenberg.

Fugleåret 2006

Sjeldne arter

Hordaland fikk to nye tilskudd til sin artsliste i løpet av 2006, nemlig rustsnipe og rosenvarsler. 23. september dukket det opp to (!) rustsniper og en alaskasnipe på Herdla. Rustsnipene holdt seg i to dager til stor glede for mange tilreisende. Dette var bare andre gang i norgeshistorien at mer enn et individ har blitt observert samtidig. Rosenvarsleren var en kjapp tur innom Voss i slutten av august, og var en ventet art i Hordaland. Av andre sjeldne arter må mongolturteldua på Fedje nevnes,

da funnet i oktober bare var det andre for fylket, der det forrige var tilbake i november 1903! En rørdrum med feil matvalg på Tysnes i april var bare den tredje innenfor fylkesgrensa, mens en svartspett på Voss i oktober var det første funnet i Hordaland siden 1988!

Komiteens arbeid og årets rapportering

Denne rapporten baserer seg på observasjoner som ble sendt inn til bruk på NOF Hordalands hjemmeside

www.fuglar.no, samt et utvalg andre observasjoner. LRSK Hordaland behandlet drøyt 100 innsendte saker, der tre ble underkjent og 14 oversendt til NSKF. Komiteen besto i rapportperioden av Eirik Nydal Adolfsen, Frode Falkenberg (sekretær), Michael Fredriksen og Oddvar Heggøy som var et nytt medlem av komiteen i år. Vi takker forøvrig Jostein Kjærandsen for sin innsats som medlem av komiteen rapportperioden fra 2002 til 2005. Av endringer i listen over arter/

underarter som skal beskrives har vi fjernet mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*. Les mer om dette i artsomtalen.

Observatører

For en fullstendig oversikt over initialene til observatørene som har bidratt med observasjoner til rapporten, se på nettsiden <http://www.fuglar.no/observatorer/>. Tusen takk for bidragene til alle sammen!

Forkortelser brukt i rapporten

- * - Observasjonen er behandlet og godkjent av LRSK
- (F,V) - Observasjonen er foto- eller videodokumentert
- Ad. - Fuglens fjærdrakt som voksen (adult)
- Juv. - Fuglens første fjærdrakt (juvenile)
- Pull. - Reirunge, eller ikke flygedyktig fugl (pullus)
- M - Hann
- F - Hunn
- FF/ind. – Hunnfarget
- 1K, 1K+, 2K+ etc. - Angir alder etter kalenderårsystemet
- N,S etc. - Trekkretning nord eller sør etc.
- Sy. - Syngende
- Rm. - Ringmerket
- S.st. - Samme sted
- As. - Askøy kommune
- Be. - Bergen kommune
- Øyg. - Øygarden kommune

Smålom *Gavia stellata*

Vinter: 1 ind. Alvheim, Øyg. 28.1 (HSA), 1 ind. Hjelme, Øyg. 2.3 (JBE) og 1 ad. Herdla, As. 11.3 (KTO m.fl.). Ingen imponerende vinterbestand i Hordaland, og årets tre fugler er noe under snittet i fylket de siste åra. Arten opererer tallrikt på trekk langs kysten, og er en fåtallig hekkefugl i Hordaland. Nærmest daglig dekning på Skogsøy, Øyg. resulterte i mer enn 2000 N løpet av perioden 24/3-1.6. De mest tallrike dagene var 8. og 9.5, med hhv. 177 N og 207 N.

Storlom *Gavia arctica*

Trekk og vinter: 1 ind. Herdla, As. 11.-18.3 (KTO m.fl.). På nordgående trek forbi Skogsøy, Øyg. ble arten påvist følgende datoer (antall i parentes om det er mer enn 1 ind.): 4.5, 8.5, 9.5 (2), 11.5 og 15.5 (3) (JBE). En fåtallig vinter- og trekkgjest i Hordaland. Våre hekkefugler har en mer østlig trekkroute som unngår ornitologers teleskoper langs vestkysten.

Islom *Gavia immer*

Alle funn: Fra Skogsøy er det rapportert 19 islom i løpet av 15 observasjonsdager i perioden 5.2-26.5 (JBE). 21. og 25.3, og 17. og 26.5 ble det sett to ind. samme dag. Videre har vi 1 ind. Solberg, Øyg. 25.2 (HSA). 1 ind. På Hellesøy, Øyg. 18.3 (THA,OHE). 1 2K Skogsøy, Øyg. 28.6 (JBE). Høsttrekket innledet med 1 S Skogsøy, Øyg. 3.9 (ATM). Videre finner vi 1 S Fedjefjorden, Fedje 11.10 (ATM). 1 S Vinappen, Fedje 11.10 (ABR,ATM). 2 S Vinappen, Fedje 12.10 (ATM). På Skogsøy, Øyg. ble det i perioden 21.10-26.11 sett 8 ind. i løpet av seks observasjonsdager (JBE). 1 ind. Herdla, As. 26.11 (MFR,THA).

Gulnebbloom *Gavia adamsii* [130/360-27/55]

Alle funn: 1 S Tjeldstø, Øyg. 28.1 (JBE). 2 ad. og 1 imm. S Skogsøy, Øyg.

9.4(JBE,JDJ). Videre fra Skogsøy ble det sett 46 N i løpet av 20 dager i perioden 21.4-24.5 (JBE), med beste dag; 15 N Skogsøy, Øyg. 29.4 (NOF Bergen) 1 S Vinappen, Fedje 29.9 (ATM). 1 ad. S Vinappen, Fedje 1.10 (ATM,OHE,IMÅ). 1 ad. S s. st. 14.10 (OHE,ATM). 2 N Skogsøy, Øyg. 21.10 (JBE). Vinterfunnet fra Tjeldstø er av den uvanlige sorten, da arten ikke er årlig utenfor trekktidene i Hordaland.

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Alle funn: 1 ind. Eio, Eidfjord 17.12-1.4 (ATM), 2 ind. Hamretjern, Be. 31.12-5.3 (BAN,THA,FFA,GGJ), 3 ind. Kløkkarvatnet, Be. 25.1 (THA), 1 ind. Kyvikjo, Stord 29.1 (THH) og maks 2 ind. Rong, Øyg. 30.1-1.4 (JBE,THA,BAN), 1 ind. Hamreelven, Be. 13.3 (FFA), 1 ind. Stordalen, Etne 19.3 (JKL,MKL). 2ad. med 4 pull. Bjellandsvatnet, Sveio 31.7* (KAU,KHA). 1 sy. Mulen, Fedje 12.10 (ABR,FFA), 1 ind. Kalandsvika, Be. 15.10 (OMO) og 1 ind. Ulvenvatnet, Os 30.12 (ATM). Hekkefunnet fra Sveio representerer bare det andre konkrete hekkefunnet i Hordaland. Det foreligger funn av både kurtiserende fugler, og ungfugler på seinsommeren fra Os og Bergen, men det eneste påviste hekkefunnet stammer fra Fitjar i september 1998.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Alle funn: 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 1.1 (JBE). 1 ind. Herdla, Askøy 1.1-11.3 (DGJ,KTO m.fl), 2 ind. Hiskjo, Bømlø 16.1 (SRO), 1 ind. Sentrum, Odda 10.2-12.2 (SOB,RVO m.fl), som representerer første funn i Odda kommune. 3 N og 1 s.st. Hellesøy, Øyg. 18.3 (THA,OHE), 1 ind. Hjelme, Øyg. 5.-14.3 (JBE), 2 ind. Hellesøy, Øyg. 1.4 (BAN,THA), 1 ind. Skogsøy, Øyg. 1.4 (JBE) og 1 ind. Skogsøy, Øyg. 29.4 (NOF Bergen). 2 ind. Herdla, Ask. 11.10 (EFR,OMO,SØS) og 2 S Vinappen, Fedje samme dag (ABR,ATM). 1 ind. Hjeltefjorden, Øyg. 21.11 (JBE) og 1 ind.

Kyvikjø, Stord 14.-17.12 (THH,ØBI). Minst 20 ind. i løpet av året er den beste opptredenen i Hordaland noensinne. Tidligere rekordår var 2003 med 14 ind. og 2002 med 12 ind. registrert.

Horndykker *Podiceps auritus* [39/56-5/6] etter 1992

Alle funn: 1 ind. Granvinsdeltaet, Granvin 30.4-1.5 var ny art for kommunen (OHE,ENY). 1 ad. Herdla, As. 31.8-3.9 (EFR,THA,ENY m.fl.), 1 1K Husvatnet, Fedje 11.10(ATM,ABR,FFA), 1 ind. Herdla, As. 5.11-16.12 (DGJ,IFR,MFR m.fl.) og 2 ind. s. st. 23.-30.12 (EFR,THA,JMO m.fl.). 1 ind. Kalandsvika, Be. 3.-17.12 (NOF Bergen).

Havhest *Fulmarus glacialis*

Desember til februar: Største antall rapportert i år var 250 N Skogsøy, Øyg. 31.5 (JBE).

Grålire *Puffinus griseus* [35/289-3/5]

Alle funn: 3 S Vinappen, Fedje 23.9* (OHE,JOS), 1 N Skogsøy, Øyg. 27.9* (ATM) og 1 S Vinappen, Fedje 1.10* (OHE,OHA,ATM,IMÅ).

Havlire *Puffinus puffinus* [38/193-1/1]

Alle funn: 1 S Skogsøy, Øyg. 3.5* (JBE).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

Alle funn: 31 ind. Vinappen, Fedje 12.8 (ABR,FFA,IFR m.fl.). 28 ind. ringmerket og 3 kontroller denne natten, hvorav en av kontrollene hadde portugisisk ring!

Havsule *Sula bassana*

Store antall og uvanlige lokaliteter: Årets høyeste antall registrert i løpet av en dag var 155 N Skogsøy, Øyg. 22.7 (ATM).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Innlandsfunn, konsentrasjoner og "mellomskarv": 4 ind. Store Lungegårdsvann, Be. 1.1-1.4 (F) (ABR,FFA,ATM m.fl.), 1 3K

Tjeldstø, Øyg. 21.7-5.8 (F) (JBE,ATM m.fl.), 7 ind. Ådlandsvatnet, Stord 15.8 (THH), 1 ind. Kalandsvika, Be. 25.-26.8 (BBE,FFA,OMO,ENY), 1 ind. Hetleflotvatnet, Os 1.9 (BAN), 1 ind. Rekvesøyane, Voss 8.9 (OHE), 3 ind. Lønøyane, Voss 8.9 (OHE), 21 ind. Storavatnet, Bømlo 9.9 (KKA), 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 22.9 (F) (JBE), 1 1K (ringmerket på Øra) Storavatnet, Bømlo 30.9 (LØK) og 1 1K (også ringmerket på Øra) Herdla, As. 1.10 (F) (IGR), maks 4 ind. Gjernesmoen, Voss 2.-7.10 (OHE), maks 2 ind. Lønøyane, Voss 4.-29.10 (JOS,THA), 1 ind. Ådlandsvatnet, Stord 29.-24.10 (THH), maks 9 ind. Granvinsvatnet, Granvin 10.11-9.12 (OHE,ATM) og 1 ind. Storavatnet, Fitjar 18.11 (THH). Mellomskarven *P. c. sinensis* har blitt hyppigere rapportert fra Hordaland de siste åra. Dette passer godt overens med underartens etablering blant annet i Østfold, og det foreligger nå flere funn av fugler som har blitt ringmerket som reirunger i kolonien på Øra ved Fredrikstad. Mange andre funn har blitt godt dokumentert, og gyldige karakterer som vinkelen på barhuden i hodet kommer fram. LSRK Hordaland endrer fom. 2006 status på underarten til fåtallig vintergjest, og tar den ut av listen over arter som må beskrives for godkjenning. Mange individer er vanskelige å bestemme, og fotodokumentasjon er nødvendig for sikker ID. Dette statusgrepet blir gjort som følge av at vi mener at arten vil bli uforholdsmessig undertallig om de skal prosesseres gjennom et rigid kvalitetssikringssystem. Vi ønsker fortsatt rapportert funn av underarten, og tar gjerne imot bildedokumentasjon av fuglene. Når det gjelder årets funn viste de med fotodokumentasjonskode i seg karakterer som peker mot mellomskarv. Fuglene i Bergen på vårvinteren var fordelt mellom minst to mellomskarv, en "vanlig" storskarv *P. c. carbo* og et ubestemt ind. Når alt dette er skrevet må det også nevnes at



Storskarv av underarten mellomskarv Phalacrocorax carbo sinensis over Store Lungegårdsvann i Bergen 25. mars 2006. Mellomskarven har etablert seg som en fåtallig men årlig gjest i Hordaland vinterstid. Les mer under artskommentaren. Foto: Arild Breistøl.

antall funn av storskarv i ferskvann har økt de siste åra. Dette henger kanskje sammen med en økt frekvens av mellomskarver i Hordaland? Mellomskarven er i alle fall mer knyttet til ferskvann enn den nordlige formen som normalt har opptrådt i fylket.

Rørdrum *Botaurus stellaris* [2/2-1/1]

Alle funn: 1 ind. Onarheim, Tysnes 17.4 (F) (P.F.Kristiansen). Denne rørdrumen ble observert i det den døde da den skulle spise en ål. Funnet er omtalt av Falkenberg (2006). Innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Knoppsvane *Cygnus olor*

Alle funn: 2 ad.og 3 2K Røyksundkanalen, Bømlo 1.-7.1 (ROL), 1 ad. Kyrkjeberget, Stord 6.1 (THH), 2 ad.og 2 2K Leirvik havn, Stord 6.1 (THH), 2 ad. S Nedre Økland, Stord 3.2 (ØBI,THH), 1 par Stordalen, Etne 5.-19.3 (JKL,MKL), 2 ad. Kyvikjo, Stord 10.3 (THH), 1 par Opsangervatnet, Kvinnherad 31.3 (RVO), 1 ad. Skånevik, Etne 2.4 (OHE), 1 2K Kyrkjeberget, Stord 9.5 (THH), 2 2K St.Lungegårdsvann, Be. 15.5 (IGR), 2 ad. Fitjar, Havn, Fitjar 15.5 (THH), 1 ad. Hellandsfjorden, Fitjar 18.5 (THH), 2 ad. Vestbøstادتjødno, Fitjar 26.5

(THH), 2 ad.og 1 2K Kyvikjo, Stord 26.5 (THH) og 2 ad. Hellandsfjorden, Fitjar 16.6-18.11 (THH). 2 ad. Husnes, Kvinnherad 15.10 (GGJ), 2 ad. Rødspollen, Sveio 21.10-3.11 (THA,KTO,IFR,MFR,THA), 2 ad. Ådlandsvatnet, Stord 21.-25.10 (THH), 3 ad. Førdespollen, Sund 27.-29.10 (T.og J. Nygaard), 2 ad.og 4 juv. Storavatnet, Bømlo 18.-23.11 (KKA,LØK), 6 ad.og 5 1K Eiriksvik, Etne 30.11 (ATM) og 1 ind. Forlandsvåg, Sund 31.12 (EFR,OMO,FHP m.fl.).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Juni til august: Vi tar først med en totaltelling fra seinvinteren, der 632 ind. ble registrert i Hordaland 18.-19.2 (SBY m.fl.). Se forøvrig Byrkjeland (2006) for mer utfyllende informasjon om tellingen. Fra sommermånedene har vi følgende funn: 1 ind. Eknes, Lindås 28.5-1.7 (MWI), 1 2K Vetlatvatnet, Voss 18.6 (BAN,OHE m.fl.), 1 ind. Hardangervidda, Eidfjord 2.7 (SKV,IMÅ,OMO m.fl.) og 1 ad. Sleirevatn, Masfjorden 25.7 (TSV).

Sædgås *Anser fabalis* [24/87-2/4]

Alle funn: 2 ind. Breivik, Øyg. 22.-23.1 (DGJ m.fl.). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 29.1-23.2 (JBE) dreier seg trolig om de samme fuglene. 2 ind. Herdla, Ask. 11.2 (DGJ). Alle fuglene viste karakterer som pekte mot tundrasædgjess (*Anser fabalis rossicus*), og er derfor oversendt NSKF for videre vurdering.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Alle funn: 1 ind. Herdla, Ask. 19.5 (ENY), 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 21.5 (JBE) og 4 ind. Ulvikpollen, Ulvik 7-8.11 (HDI).

Tundragås *Anser albifrons* [75/386-5/24]

Alle funn: 2 ad.og 3 2K (*A. a. albifrons*) Ådnevik, Øyg. 22-24.1 (DGJ m.fl.), 3 ad. Tjeldstø, Øyg. 23.2 (JBE), 1 ad. Kjøl, Bømlo 2.10 var blitt til 5 ad. (*A. a. albifrons*) 4.10 (OHA) og 8 ind. Herdla,

Ask. 11.10 (EFR,AHÅ,OMO,SØS). 3 vestlige tundragjess (*flavirostris*) Herdla, As. 11.-23.10* (F) (OMO,FHP,AHÅ m.fl.).

Grågås *Anser anser*

Desember - februar: 9 ind. Nedre Økland, Stord 10.12-15.1 (THH), maks 2 ind. Herdla, Ask. 4.-21.1 (BAN,DGJ m.fl.), 5 ind. Tjeldstø, Øyg. 20.-21.1 – de samme individene pendlet trolig mellom Tjeldstø og Breivik i perioden 22.-29.1 (JBE,DGJ m.fl.). 7 ind. Herdla, Ask. 21.2 (OMO), 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 23.2 (JBE) og 1 N Svellingen, Øyg. 25.2 (HSA,JBE). 2 ind. Herdla, Ask. 27.-30.12 (THA,JMO m.fl.).

Stripegås *Anser indicus*

Alle funn: 1 ad. Herdla, As. 29.-31.5* (F) (FFA,GJE). Fylkets sjettede funn (av totalt 8 ind.), men LRSK følger NSKF i kategorisering av arten, nemlig E. Dette er en kategori som omfatter rømlinger, og arten regnes ikke på listen over spontant forekommende arter i fylket.

Snøgås *Anser caerulescens*

Alle funn: 1 2K+ Herdla, As. 21.5* (F) (EFR). Fuglen hadde ringer på beina, og er høst trolig en rømt fangenskapsfugl. Funnet går dermed ikke inn som et nytt tilskudd til Hordalands artsliste over spontane fuglearter. Se for øvrig omtalen av stripegås.

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Alle funn: 1 ind. Herdla, As. 12.2 (DSH), 2 N Skogsøy, Øyg. 19.4 (JBE). 123 N Skogsøy, Øyg. 27.4 (JBE). 797 N Skogsøy, Øyg. 30.4 (JBE). 54 N Skogsøy, Øyg. 1.5 (JBE). 113 N Skogsøy, Øyg. 2.5 (JBE). 127 N Skogsøy, Øyg. 3.5 (JBE). 76 N Skogsøy, Øyg. 13.5 (JBE). 22 N Herdla, As. 13.5 (DGJ), 825 N Skogsøy, Øyg. 18.5 (JBE), 143 N Skogsøy, Øyg. 24.5 (JBE). 311 N Skogsøy, Øyg. 25.5 (JBE). 2048 N Skogsøy, Øyg. 26.5 (JBE,JDJ,HTO). Vi

merker oss at det nordgående vårtrekket var usedvanlig seint i vår. Værforholdene spiller en avgjørende rolle for når gjessene forlater overvintringsområdene i Skottland, og det var tydeligvis ikke akseptable forhold i den normale perioden som er rundt 1. mai. 5172 S forbi Fedje i perioden 23.9.-11.10, med 3380 S 23.9 (OHE,JOS,ATM,IMÅ m.fl.). I perioden 28.9.-10.10 rastet et antall gjess på Stormark, Fedje, med toppnotering 180 ind. 1.10 (ATM,OHE,NOF Bergen m.fl.). 59 ind. Herdla, As. 11.10 (EFR,AHÅ,OMO), 41 ind. Herdla, As. 14.10 (FHP,OMO m.fl.). 2 ind. holdt seg på samme lokalitet fra 18.10.-2.12, og økte til 3 ind. 16.-31.12 (THA,OMO,EFR m.fl.). Observasjonene fra høsten stemmer godt overens med normal tid for arten.

Ringgås *Branta bernicla*

Alle funn: 1 N Skogsøy, Øyg. 17.5 (JBE). 1365 ind. N Skogsøy, Øyg. 27.-31.5, med 955 N 30.5 som toppnotering (JBE). Ultimo mai er toptid for å se nordtrekkende vestlige lysbukete ringgjess (*B. b. hrota*) forbi Hordalandskysten. Et uvanlig stort antall av østlige mørkbukete ringgjess (*B. b. bernicla*) gjestet Hordaland i oktober og november: 1 ad. Herdla, As. 4.10* (F) (GGJ), 4 ad. Sævarhagsvikjo, Stord 6.10* (THH,N.Askeland), 3 ad. Stormark, Fedje 10.-12.10* (F) (FFA,ABR,ATM m.fl.), 2 ind. Herdla, As. 11.-14.10* (F) (EFR,OMO,SØS m.fl.), 2 ad. Breivik, Øyg. 12.-15.10* (F) (MFR,THA,ABR,GHÖ), 9 ad. Stormark, Fedje 13.-15.10* (F) (ABR,FFA,OHE,ATM), 2 ad. Framnes, Kvam 1.-17.11* (F) (JMO m.fl.). Dessuten foreligger følgende funn av ikke underartsbestemte fugler: 8 ind. Selbjørn, Austervoll 2.10 (K.Eliassen). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 19.10 (JBE). 1 ind. Torsvik, Øyg. 25.10 (D.Torsvik), 3 S Kollsnes, Øyg. 31.10 (KPG) og 2 ad. Vinnes, Fusa 30.11 (R.Vindenes). De andre observasjonene tatt i betraktning, så kan mye tyde på at dette også dreide seg om østlige fugler. Vestlige

ringgjess raster sjeldent i Hordaland, og det foreligger kun tre tidligere funn av underarten.

Gravand *Tadorna ferruginea*

Hekkefunn og funn medio november til medio februar: Som vanlig finner vi de eneste hekkefuglene på Herdla, As., der et par hekket og 1 F passet på 3 pull. Og etter hvert juv. i perioden 29.6-11.8 (Osaland 2006). Fra rapportperioden har vi 1 ind. Herdla, As. 19.11 (MFR).

Brunnakke *Anas penelope*

Desember - februar: 1 F Muthaugtjern, Be. 1.1 (THA), 1 M Vikastemmo, Stord 17.1, og trolig samme ind. Kyrkjeberget, Stord 21.1 (THH). 1 M Nesttunvatnet, Be. 22.1 (K.Grieg), 3 M og 4 F Skjenavannet, Be. 17.-22.1 økte til 10 ind. 23.-24.1 (THA,ABR,GHÖ), 1 par St. Lungegårdsvann, Be. 29.1, 6 F + 3 M Tveitevatnet, Be. 29.1 (GKJ), 1 F Langevatnet, Be. 2.2 (ABJ), 1 M Eldøy, Stord 2.-3.2 (THH), 10 M og 12 F Ortuvatnet, Be. 8.2 (DSH), 1 par Kyrkjeberget, Stord 10.2 (THH), 1 ad. M Røykenesvatnet, Be. 12.2 (ABR,FFA), 3 M og 1 F Skjenavatnet, Be. 13.2 (THA), 4 M og 3 F Nesttunvatnet, Be. 13.2 økte til 3 par 18.2 (GKJ,ABR,GHÖ). Maks 6 ind. Muthaugtjern, Be. 2.-9.12 (THA), 1 par Solheimsvatnet, Be. 10.12 (FFA,GGJ), 1 par Kristianborgvatnet, Be. 10.12 (GGJ), 1 ind. Skjenavann, Be. 17.12 (THA), 1 M Nordheimsund, Kvam 20.12 (JMO), 1 M + 2 F Store Nesttunvann, Be. 25.12 (GGJ), 1 ind. Gjernesmoen, Voss 26.12 (OHE) og 8 par Tveitevatnet, Be. 26.12 (GGJ).

Snadderand *Anas strepera* [26/38-2/2]

Alle funn: 1 M Melsvatnet, Voss 28.4* (ECH,OHE) og 1 F samme sted 30.-31.12* (F) (OHE).

Krikkand *Anas crecca*

Desember - februar: Herdla, As. jan.-feb.: 10 ind. 4.1 (DGJ), 3 F + 1 M 12.1

(DGJ), 5 M + 4 F 15.1 (KTO), 4 M + 4 F 16.1 (DGJ), 2 ind. 18.1 (BAN,DGJ), 1 F 31.1 (THA,OMO) og 7 ind. 8.2 (GJE). 1 par Lønningen, Be. 14.1 (GGJ), 2 par Brakstadvatnet, Meland 18.2 (ABR,GHÖ). 1 par Granvinsvatnet, Granvin 9.12 (OHE), 1 ind. Muthaugtjern, Be. 9.12 (THA), 1 M Granvinsvatnet, Granvin 4.-11.12 (ATM,OHE), 1 F Herdla, As. 16.-23.12 (THA,OMO,EFR), 9 ind. Muthaugtjern, Be. 22.12 (THA), 17 ind. Rekvesøyane, Voss 23.12 (OHE), 13 ind. Muthaugtjern, Be. 25.12 og 5 ind.samme sted 26.12 (THA). 2 ind. Herdla, As. 27.-30.12 (THA,JMO m.fl.), 10 ind. Rekvesøyane, Voss 30.12 (OHE), 1 M Muthaugtjern, Be. 30.12 (THA) og 7 ind. Stendavatnet, Be. 31.12 (GGJ).

Stjertand *Anas acuta*

Alle funn: 1 F Prestegardsmoen, Voss 13.4 (ECH), 2 N Skogsøy, Øyg. 15.4 (JBE), 1 M Granvinsvatnet, Granvin 17.4 (ATM), 1 par Eidfjord 17.4 (ATM), 1 par Melsvatnet, Voss 21.-28.4 (OHE,ECH), 4 N Skogsøy, Øyg. 2.5 (JBE), 1 par Garen, Eidfjord 4.5 og 1 F samme sted 20.5 (ATM). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 22.9 (JBE), 1 ind. Ulvesetvatnet, Fjell 8.10 (ABR,GHÖ), 1 par Herdla, As. 12.11-23.12 (THA,OMO m.fl.), 1 ind. Herdla, As. 26.-30.11 (MFR,THA,OMO) og 1 M samme sted 12.11-31.12 (THA,OMO m.fl.). Det årlige gjennomsnittet i Hordaland er på drøyt ti individer, så årets 20 ind. er meget bra!

Knekkand *Anas querquedula* [48/86-5/10]

Alle funn: 1 M Maurset, Eidfjord 4.-6.5* (F) (ATM). Ny art for Eidfjord kommune. 1 M Kjøl, Bømlo 6.5* (OHA,KBE m.fl.), 2 par Sævarhagsvikjo, Stord 8.5* (THH,AVA), 1 M Rimbareidstjødnø, Fitjar 26.5* (THH) og 1 M + 2 F Lønøyane, Voss 13.6* (OHE).

Skjeand *Anas clypeata*

Alle funn: 2 M Herdla, As. 26.4 (JDJ), 2

N Skogsøy, Øygarden 4.5 (JBE), 1 par Gjernesmoen, Voss 20.5 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 11.-24.9 (ABJ,TLI,KAU m.fl.), 2 ind. Herdla, As. 27.9 (EFR,THA), 1 ind. Muthaugtjern, Be. 6.-23.10 (THA,GGJ), 1 ind. Herdla, As. 11.-14.10 (SØS m.fl.) og 2 ind. Herdla, As. 21.10 (AHÅ).

Taffeland *Aythya ferina*

Alle funn: 1 M Storavatnet, Bømlo 6.1 (LØK) og 1 M Grandane, Voss 3.5 (OHE).

Bergand *Aythya marila*

Alle funn utenfor hekkeområdene: 5 ind. Herdla, As. 4.-7.1 (DGJ m.fl.), 3 ind. Herdla, As. 12.1 (DGJ), 2 F Lundarosen, Voss 15.1 (OHE), 10 F Herdla, As. 15.1 (KTO), 3 ind. Herdla, As. 16.1 (DGJ), 5 ind. Herdla, As. 18.1 (BAN,DGJ), 15 ind. Herdla, As. 21.1 (IFR,THA,OMO), 1 F Lundarosen, Voss 3.2 (OHE), 1 F Seimsvatnet, Voss 18.2 (OHE), 20 ind. Eikelandsosen, Meland 18.2 (ABR,GHÖ), 3 ind. Eikangervåg, Lindås 24.2 (MWI,D. Wallem), 8 ind. Hjelmåsvågen, Lindås 5.3 økte til 48 ind. 12.3 og 60 ind. 19.3 (TSV), 2 F Seimsvatnet, Voss 13.3 (OHE), 1 F Seimsvatnet, Voss 19.-29.3 (OHE). 2 ind. Rekvesøyane, Voss 24.9 (OHE,JOS), 1 ind. Kristianborgvatnet, Be. 24.10, 3 1K Melsvatnet, Voss 10.11 (OHE), 1 1K Lundarosen, Voss 10.11 (OHE), 1 1K Osavatnet, Be. 20.-31.12 (MFR), 1 1K M Solheimsvatnet, Be. 24.12 (ATM) og 1 ind. Kristianborgvatnet, Be. 25.12 (GGJ).

Praktærfugl *Somateria spectabilis* [22/37-0/0]

Alle funn: Gamlefar dukket opp igjen på Herdla, As. etter en tids fravær 11.3 (KTO m.fl.). En voksen M Toska, Radøy 14.4 er trolig den samme fuglen (ABJ,TSV). Fuglen dukket opp igjen til sin 21. overvintring 18.7 og ble sett fram til 27.9. Etter sju ukers fravær dukket den opp igjen 12.11, og holdt seg fram til 9.12 (Osaland 2006).

Havelle *Clangula hyemalis*

Hekkefunn og ferskvann vinter: 1 ind. Grandane, Voss 17.12 (OHE).

Svartand *Melanitta nigra*

Hekkefunn og ferskvann vinter: Vi tar denne gang med noen uvanlig store ansamlinger fra indre strøk: 43 ind. Vossavassdraget, Voss 29.10 (OHE,JOS) og 50 ind. Sørfjorden, Ullensvang 5.11 (IMÅ,RVO).

Sjørre *Melanitta fusca*

Hekkefunn og ferskvann vinter: 1 ad. M Stavanes, Eidfjord 7.2-25.4 (ATM).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

Alle funn: Fra Kalandsvika, Be. er det rapportert 2 ind. 7.2 (BAN), 3 F 25.2 (JDJ), 1 ind. 8.-21.4 (GJE,ATM m.fl.), 2 ind. 12.11 (ATM), 3 ind. 3.12 (NOF Bergen), 1 ind. 3.-23.12 (NOF Bergen) og 3 ind. 30.12 (ATM). 2 ind. Hatlestad, Be. 9.2 dreier seg trolig om fuglene fra Kaland (IFR). Ellers i fylket 1 F Eikangervåg, Lindås 1.3 (MWI,D.Wallem), 1 F Stordalen, Etne 5.3 (JKL,MKL), 1 F Kjøl, Bømlø 7.4 (OHA), 1 2K M Eikangervåg, Lindås 8.4 (MWI), 1 ind. Indre Hamre, Be. 12.-22.4 (ABR,GHÖ) og 1 F Vassel, Lindås 16.-17.4 (TSV). I Kalandsvika, Be. dukket 2 hunnfargete ind. opp igjen 12.11 (NOF Bergen) og maks 3 FF ble observert i perioden 3.-30.12 (NOF Bergen).

Sivhauk *Circus aeruginosus* [20/20-1/1]

Alle funn: 1 M N Skogsøy, Øyg. 9.5* (JBE).

Myrhauk *Circus cyaneus* [29/31 til 36-6/6]

Alle funn: 1 M Lønnetjern, Be. 7.5* (GGJ). 1 ad. M Hardangervidda, Eidfjord 26.6* (ATM), 1 F Hardangervidda, Eidfjord 30.6* (SKV,IMÅ,OMO m.fl.), 1 F Bjoreidalen, Eidfjord 16.7* (ENY), 1 ind. Gullfjellet, Be. 15.9* (JDJ) og 1 M Morland, Fjell 1.10* (C.Bramham).

Musvåk *Buteo buteo* [50/65-9/14]

Alle funn: 1 ind. Årstad, Be. 3.-6.4 (DSH), 1 par med hekkeadferd ved Lindås 4.5 (FFA m.fl.), 2 ind. Årstad, Be. 22.-24.5 (DSH), 1 ind. Rød, Sveio 29.5 (BAN,DGJ,FHP), 1 ind. (mørk morf) Ortuvatnet, Be. 13.8 (ABR,FFA,GHÖ), 1 ind. Gjerdfjellet, Lindås 3.9 (MWI), 1 S Gjernesmoen, Voss 9.9 (OHE), 1 ind. Gåssand, Os 9.9 (OMO) og 4 ind. Lindås 9.9 (MWI). Strengt tatt kan de tre funnene fra Lindås inneholde like fugler, men vi vurderer de som forskjellige individer da observasjonssted- og tid er såpass langt fra hverandre.

Fjellvåk *Buteo lagopus*

November til medio mars: 1 ind. Bordalen, Voss 16.12 (OHE). 2005: 1 ind. Hildal, Odda 3.11 (RVO). De første vinterfunnene i fylket siden 2002, da det var hele fire funn i løpet av de kalde månedene.

Fiskeørn *Pandion haliaetus* [83/83-6/6]

Alle funn: 1 ind. Sandvin, Odda 23.4 (A.Kvam m.fl.), 1 ind. Sandvikvatnet, Lindås 28.4 (MWI), 1 ind. Tveitevatnet, Be. 28.5 (FFA). 2 ind. Oddadalen, Odda 1.-15.9 (IMÅ,BJA,RVO), 1 ind. Oddadalen, Odda 2.10 (IMÅ) og 1 ind. Sandvin, Odda 7.10 (IMÅ). Fotografier viser at observasjonene fra Odda i september dreier seg om minst to individer, muligens tre. Odda er fylkets desidert sikreste plass for å få et glimt av arten. Mer oppsiktsvekkende var fiskeørna som fløy gjennom Bergensdalen i mai!

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

November - februar: 1 ind. Grønsdal, Odda 28.1 (ALA), 1 ind. Herdla, As. 31.1 (THA,OMO), 1 ind. (død) Aga, Ullensvang 9.2 (KGR) og 1 ind. Øvre Eidfjord, Eidfjord 22.12 (ATM).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Alle funn utenfor hekkeområder: 1 ind. Lindås 9.9 (MWI). En sjelden og ikke årlig art i det Hordalandske lavland.



Voksen vandrefalk hunn på jakt i Lille Lungegårdsvann, Bergen 12. mars 2006. Et par ble sett jevnlig på jakt i sentrum av Bergen gjennom store deler av vinteren. Foto: Frode Falkenberg.

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Alle funn utenom hekking: 1 ind. Haakonssvern, Be. 2.1 (MFR), 1 par holdt seg i sentrum av Bergen fra nyttår fram til primo April (FFA m.fl.), 1 ind. Skogsøy, Øyg. 28.1 (HSA), 1 ind. Herdla, As. 25.2 (DGJ), 1 ind. Turøy, Fjell 4.3 (MFR,IFR), 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 7.3 (JBE), 1 ad. M Byparken, Be. 7.3-4.4 (FFA), 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 13.4 (DGJ), 1 2K Herdla, As. 26.4 (JDJ), 1 2K Herdla, As. 1.5 (ENY), 1 ind. Eknes, Lindås 7.5 (MWI). 1 ad. M Kollsnes, Øyg. 7.8 (KPG), 1 ind. Garen, Eidfjord 13.8 (ATM), 1 1K Herdla, As. 16.8 (FFA,EFR), 1 ad. Turøy, Fjell 20.8 (JOP), 1 ad. Gjernesmoen, Voss 22.8 (OHE), 1 1K Skogsøy, Øyg. 29.8 (JDJ,NTL), 1 ad. Herdla, As. 3.9 (THA,ENY), 1 ad. S Haugamoen, Voss 9.9 (OHE), 1 ad. Gjernesmoen, Voss 9.9

(OHE), 1 ind. Herdla, As. 11.9 (OWJ), 1 1K Herdla, As. 16.9 (OMO,FHP), 1 ind. Herdla, As. 23.9 (BAN,THA,TLI m.fl.), 1 ad. + 1 1K Herdla, As. 25.9 (ABR,FFA,GHÖ m.fl.), 1 1K S Vinappen, Fedje 28.9 (ATM), 1 1K S Vinappen, Fedje 29.9 (ATM), 1 ad. Herdlevær, Øyg. 1.10 (DGJ,TLI), 1 ad. Vinappen, Fedje 1.-11.10 (OHE,ATM,IMÅ m.fl.), 1 1K Misje, Øyg. 15.10 (ABR,GHÖ), 1 ind. Marsteinen hotell, Sund 21.10 (FFA,OOV,RVO m.fl.), 1 1K Golten, Sund 21.10 (FFA), 1 ad. Maurset, Eidfjord 22.10 (ATM), 1 ind. Byparken, Be. 22.11 (FFA) og 1 ind. Glesvær, Sund 17.12 (MFR).

Vaktel *Coturnix coturnix* [12/12-1/4]

Alle funn: 4 ropende ind. Myrkdalsdelta, Voss 7.7* (OHE,JOS) og 2 ind. s. st. 16.7 (OHE). Dette er første gang mer enn et

individ har blitt observert innen et så lite område i Hordaland. Myrkdalsdeltaet synes etter hvert å ha blitt en fast plass for arten hos oss.

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Alle funn: 1 ind. Kristianborgvatnet, Be. 1.1 (JPS), 1 ind. Espeland, Be. 1.1 (THA), 1 ind. Eltervatn, Osterøy 2.1 (TBR), 1 ind. Kloppedalstjern, Be. 4.2 (GGJ), 1 ind. Landro, Fjell 7.2 (JDJ), 1 ind. Ortuvatnet, Be. 11.2 (JOP), 1 ropende ind. Vestbøstادتjødno, Fitjar 15.-26.5 (THH,OBH), 2 ropende ind. Rimbareidstjødno, Fitjar 20.-26.5 (THH,OBH), 1 ind. Ortuvatnet, Be. 18.10 (MOL), 1 ind. Telavåg, Sund 21.10 (ECH,FFA), 1 ind. Nesvika, Be. 22.10 (JDJ), 1 ind. Biologisk stasjon, Flesland, Be. 11.11 (THA), 1 ind. Muthaugtjern, Be.

11.11 (THA), 1 ind. Storavatnet, Be. 11.11 (THA), 2 ind. Telavåg, Sund 17.12 (MFR), 1 ind. Mildevann, Be. 26.12 (MFR) og 1 ind. Telavåg, Sund 31.12 (EFR,OMO,FHP m.fl.).

Myrrikse *Porzana porzana* [27/33-1/1] etter 1970

Alle funn: 1 ropende ind. Myrkdalsdeltaet, Voss 27.6-7.7* (L) (JOS,OHE).

Åkerrikse *Crex crex* [66/69-3/3] etter 1970

Alle funn: Ropende enkeltindivider på følgende lokaliteter og datoer: Meling, Bømlo 28.5* (GOL), Ulvikpollen, Ulvik 9.7* (OHE) og Vele, Voss 15.7* (OHE).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Alle funn: 1 2K Nygårdsparken, Be.

Dverglo *Caradrius dubius* fra Grandane på Voss 14. mai. Like etter at paret hadde lagt sine egg ble reiret ødelagt og hekkingen mislykket. Foto: Oddvar Heggøy.



25.11-20.3 (FFA,HSA,THA), 1 2K Tveitevatnet, Be. 9.12-26.2 (OMO,HSA m.fl.), 1 ind. Skranevatnet, Be. 14.1 (GGJ), 1 ind. Hopselven, Be. 22.1 (KGR), 3 ind. Hopselven, Be. 29.1 (KTO), 2 ind. Hopsvannet, Be. 24.3 (RVI), 2 ind. Nygårdsparken, Be. 25.3-5.4 (ABR,FFA), 2 ind. Forvatnet, Be. 9.4 (TLI) og 1 ind. s. st. 7.5 (TLI). 1 ind. Muthaugtjern, Be. 8.5 (THA) og 1 ropende ind. Rimbareidstjødn, Fitjar 15.5-21.5 (THH,OBH). 1 1K Nygårdsparken, Be. 4.10-10.12 (FFA m.fl.), 1 ind. Storavatnet, Be. 5.-28.10 (LØK,THA) – 1 ad. + 1 1K ble observert samme sted 7.10 (LØK). 1 ind. Hamreelven, Be. 25.11 (MFR,THA), 1 ad. Hopsvannet, Be. 25.11 (GGJ), 1 ad. ble observert sammen med den unge fuglen i Nygårdsparken, Be. 10.12 (FFA, MFR m.fl.), 1 ind. Tveitevatnet, Be. 18.12 (ATM), 1 ad. Solheimsvatnet, Be. 24.12 (ATM), 1 ind. Telavåg, Sund 31.12 (EFR,OMO,FHP m.fl.) og 1 ind. Fløen, Be. 31.12 (HSA).

Trane *Grus grus*

Trekk: 1 ind. Mo, Granvin 2.4 (GJE), 1 ind. Areklett, Masfjorden 6.5 (R.Garmann), 4 ind. Vinnes, Fusa 7.5 (F.Olsen), 5 ind. Isdalen, Eidfjord 7.5 (ATM), 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 15.6 (JBE), 5 ind. Bjoreidalen, Eidfjord 14.7 (IMÅ) og 2 ind. Langvass, Eidfjord 15.7 (IMÅ).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Desember – februar (overvintrende): 2 ind. Hjelme, Øyg. 1.2 (JBE). Årets første vårtrekkere var 3 ind. Hellesøy, Øyg. 25.2 (HSA) og 2 ind. Svellingen, Øyg. 25.2 (HSA,JBE).

Dverglo *Charadrius dubius* [11/15-3/4]

Alle funn: 1 ind. Rekvesøyane, Voss 5.-6.5* (F) (ECH,OHE). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 6.5* (F) (JBE). 1 par Grandane, Voss 14.5-8.6* (F) (OHE) reir med 4 egg funnet 6.6 men eggene var borte 8.6, dette er det

andre konstaterte hekkefunn i fylket. Det er vanskelig å vurdere antall på Voss, men vi inkluderer tre nye individer i statistikken.

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Desember - januar: 1 ind; årets første, Herdla, As. 19.-21.2 (OMO,EFR). Arten er ingen vanlig hekkefugl i lavlandet i Hordaland, men finnes meget fåtallig i passende habitater. Nevneverdig er minst seks par som gikk til hekking innenfor gjerdet til oljeraffineriet på Mongstad, Austrheim i løpet av sommeren (FFA,H. G.Skarstein).

Boltit *Charadrius morinellus*

Trekk: 1 ind. rastet sammen 3 heilo på Flesland, Be. 23.4 (THA). Videre har vi 5 ind. Herdla, As. 15.5 (GJE), 1 ind. Kollsnes, Øyg. 31.5-1.6 (KPG), og 1 F Herdla, As. 2.6 (ENY).

Heilo *Pluvialis apricaria*

November til medio februar: 1 ind. Herdla, As. 31.12 (DGJ,ATM). Årets første trekkere var 3 ind. Kvamskogen, Kvam 19.3 (BLO).

Tundralo *Pluvialis apricaria*

Desember til juli: 1 ind; årets første, Tjeldstø, Øyg. 4.5 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 6.5 (OMO). Arten er sjelden på vårtrekk.

Vipe *Vanellus vanellus*

Desember - januar: 2 ind. Herdla, As. 16.12 (THA,OMO). 2 ind. samme sted 21.-30.12 (OMO,THA,JMO m.fl.). 2 ind. Herdla, As. 1.-18.1 (DGJ,BAN). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 20.-21.1 (JBE). 3 ind. Breivik, Øygarden 25.1 (DGJ). 1 ind. Sele, Bømlo 25.1 (SRO,LØK). 1 ind. Kollsnes, Øyg. 26.1 (KPG). 1 ind. Stend, Be. 27.1 (ABJ). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 28.1 (HSA). 1 ind. Havn, Fitjar 28.1 (K.O.Øgård). 1 ind. Flesland gård, Be. 29.1 (THA). 1 ind. Fana prestegård, Be. 25.-29.1 (THA,BAN). 7 ind. Austrheim, Austrheim 29.1 (EFR). Årets



Voksen alaskasnipe Calidris melanotos på Tjeldstø, Øygarden 22. juni 2006. Merk utposningen på fuglens bryst! Les mer om dette i artsomtalen. Foto: Frode Falkenberg.

første trekker var 1 ind. Sævarhagsvikjo, Stord 12.2 (THH). Artens vinteropptreden i Hordaland varierer mye, fra ingen til toppvintre som 2004/2005 da hele 500 ind. ble sett. Disse tallene avhenger av hvordan værforholdene er på overvintringsplassene i Storbritannia.

Polarsnipe *Calidris canutus*

November til juli: 50 N Skogsøy, Øyg. 23.5 (JBE). 1 1K Gjernesmoen, Voss 30.8-3.9 (OHE) representerer et sjeldent innlandsfunn.

Sandløper *Calidris alba*

Alle funn: 1 ad., trolig første funn i kommunen, Tinnhølen, Eidfjord

26.7 (ATM). 5 ind. Herdla, As. 23.9 (BAN,THA,TIL m.fl.). 5 S Vinappen, Fedje 1.10 (OHE,ATM,IMÅ).

Dvergsnipe *Calidris minuta*

November til juli: 1 1K Gjernesmoen, Voss 3.9 (OHE) sjeldent innlandsfunn.

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Alle funn utenfor hekkeområdene: 1 1K Herdla, As. 29.8-3.9 (JOP,EFR,THA,ENY m.fl.).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* [3/3-2/2]

Alle funn: 1 ad. M Tjeldstø, Øyg. (F) (JBE,FFA). 1 1K Herdla, As. 23.9** (BAN,THA,TLI). Fuglen på Tjeldstø

hadde en velutviklet brystpose (se bilde). Denne karakteren utvikles av hannene enten på hekkeplassen, eller like før de ankommer. Det er meget uvanlig å se dette hos alaskasniper på vårtrekk i USA. Skal man tro at alaskasnipa på Tjeldstø hadde vært der i en periode og spilt for hunner som ikke kom? Fuglen var i alle fall aggressiv, og jaget andre fugler som f.eks. enkeltbekkasin om de kom for nær favorittområdet. Det foreligger 144 funn (av 155 individer) i Norge fram tom. 2005 (Olsen og Mjølvsnes 2007).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Ansamlinger: 80 ind. Svellingen, Øyg. 1.3 (JBE). 60 ind. Skogsøy, Øyg. 10.3 (JBE). 80 ind. Hellesøy, Øyg. 1.3 (THA,OHE).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Desember til februar: 2 ind. Herdla, As. 12.1 (DGJ). 1 ind. Herdla, As. 16.-21.1 (DGJ,BAN m.fl.). Årets første trekker var 1 ind. Herdla, As. 13.3 (JDJ).

Rustsnipe *Tryngites subruficollis* [0/0-1/2]

Alle funn: 2 ind. Herdla, As. 23.-24.9** (F) (BAN,THA,TIL m.fl.). Første funn i Hordaland! Det foreligger 27 funn av arten i Norge fram tom. 2005 (Olsen og Mjølvsnes 2007). Se også Lislevand (2006) for grundig omtale og mange bilder av rustsnipene på Herdla.

Brushane *Philomachus pugnax*

Hekkefunn og november til mai (trekk): Ingen funn i perioden, men vi tar med 115 ind. Herdla, As. 26.8 (BAN,THA,OMO), som var største rapporterte største ansamling i år.

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Alle funn: 1 ind. Langavatnet Åsane, Be. 7.1 (AHÅ). 1 ind. Herdla, As. 7.1 (THA,GJE,OMO). 1 ind. Breistein, Be. 9.1 (K.Michelsen). 1 ind. Tjeldstø,

Øyg. 24.1 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 23.9 (BAN,THA,TIL m.fl.). 2 ind. samme sted 27.9 (ABR,GHÖ,EFR,THA). 2 ind. Stormark, Fedje 30.9 (NOF m.fl.). 3 ind. Stormark, Fedje 1.10 (NOF m.fl.). 1 ind. Grandane, Voss 6.10 (OHE). 2 ind. Stormark, Fedje 10.10 (JDJ). 1 ind. Kirkegården, Fedje 10.10 (ABR,FFA). 1 ind. Rekvesøyane, Voss 11.10 (JOS). 3 ind. Fedje, Fedje 11.10 (FFA,ATM). 1 ind. Herdla, As. 11.10 (EFR,OMO). 1 ind. Stormark, Fedje 12.10 (ABR,FFA). 3 ind. Flesland gård, Be. 13.10 (THA). 3 ind. Herdla, As. 14.10 (FHP,OMO m.fl.). 1 ind. Krossøy, Austrheim 16.10 (MWI). 2 ind. Herdla, As. 18.10 (EFR,OMO). 1 ind. Vatna, Stord 24.10 (THH). 1 ind. Sandvin, Odda 26.10 (RVO).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Desember til februar: 2 ind. Herdla, As. 2.12 (EFR,OMO). 1 ind. Kalandsviken, Be. 3.12 (NOF Bergen). 1 ind. Flesland gård, Be. 3.12 (THA). 2 ind. Herdla, As. 16.12 (THA,OMO). 1 ind. Nesvika, Be. 17.12 (GGJ). 2 ind. Tveitevannet, Be. 18.12 (ATM). 1 ind. Nedre Økland, Stord 24.12 (THH). 2 ind. Flesland, Be. 25.12 (THA). 1 ind. Herdla, As. 27.12 (THA,OMO). 17 ind. Ulvenvannet, Os 30.12 (ATM). 1 ind. Flesland, Be. 1.1 (THA). 1 ind. Hopnessjøen, Austrheim 1.1 (ABJ). 2 ind. Alversund, Lindås 1.-7.1 (L.R.Fiske). 2 ind. Langavatnet Åsane, Be. 7.1 (AHÅ). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 20.-21.1 (JBE). 3 ind. Herdla, As. 7.-21.1 (THA,GJE,OMO m.fl.). 1 ind. Kyvikjo, Stord 28.1 (THH). 2 ind. Nedre Økland, Stord 22.-29.1 (THH). 5 ind. Herdla, As. 31.1 (THA,OMO). 1 ind. Haukåsmyrene, Be. 2.2 (ABJ). 2 ind. Austrheim, Austrheim 16.2 (OWS). 1 ind. Kalandsvika, Be. 20.2 (OMO). 3 ind. Herdla, As. 21.2 (OMO). Ellers kan nevnes 45 ind. Herdla, As. 26.8 (BAN,THA,OMO). Årets første trekker var 5 ind. Nesvika, Unneland, Be. 8.4 (GGJ).



To rustsniper Tryngites subruficollis oppholdt seg på Herdla, Askøy fra 23. til 24. september 2006. Dette var det første funnet av denne nord-amerikanske arten i Hordaland. Bildet er tatt 24. september. Foto: Frode Falkenberg.

Rugde *Scolopax rusticola*

Desember til februar: 1 ind. Flesland, Be. 2.12 (THA). 2 ind. Rubbestadneset, Bømlo 4.12 (GOL). 1 ind. Årvikstrand, Kvinnherad 9.12 (KGR). 1 ind. Skranevatnet, Be. 30.12 (B.Almås). 1 ind. Herdla, As. 23.-30.12 (EFR,THA m.fl.). 1 ind. Flesland, Be. 1.1 (K.Hansen). 3 ind. Herdla, As. 7.1 (THA,GJE,OMO). 2 ind. Kollsnes, Øyg. 16.1 (KPG). 1 ind. Ytre Arna, Be. 27.1 (ABJ). 1 ind. trafikkdrept Lauvås, Austrheim 29.1 (FFA m.fl.). 1 ind. Alversund, Lindås 11.2 (HBJ). 1 ind. Grimsåsen, Stord 12.2 (THH). 1

ind. Totland, Be. 12.2 (K.G.Flo). 1 ind. Hystadmarka, Stord 14.2 (THH). 1 ind. funnet død Ulriken, Be. 22.2 (B.Helle). 1 ind. funnet død Nubbevann, Be. 26.2 (G.Flatebø). Årets første trekker var 1 ind. Flesland, Be. 19.3 (THA).

Svarthalespove *Limosa limosa* [58/106-5/6]

Allefunn: 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 13.5* (JBE), trolig *islandica*. 2 ind. *islandica* Herdla, As. 13.5* (F) (DGJ). 1 ind. *islandica* Herdla, As. 17.-20.5* (F) (FFA,ENY,DGJ). 1 ad. Herdla, As. 9.8* (DGJ). 1 2K+ Stormark, Fedje 12.8* (F) (ABR,FFA).

Fjelljoen Stercorarius longicaudus er en sjelden fugl å observere på trekk langs Hordalandskysten. Arten er derimot mer sikker å treffe på i fjellet når det er gode smågnagerår: Et titalls par gikk til hekking på Hardangervidda i sommer, men trolig var den reproduktive suksessen lav som følge av smågnagersvikt utover i hekkesesongen. Fuglen på bildet stammer fra Hardangervidda, Eidfjord 17. juni 2006. Foto: Frode Falkenberg.



Lappspove *Limosa lapponica*

November til juli: 7 N Skogsøy, Øyg. 4.4 (JBE). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 23.-26.4 (ABR,GHÖ m.fl.). 1 ind. Herdla, As. 4.6 (BAN). 9 ind. inkl. 2 ad. M(4 ind. 3.7 og 2 ind. 5.7) Herdla, As. 3.-5.7 (DGJ,BAN,OMO). 2 ad. M S Skogsøy, Øyg. 24.7 (ATM). Ellers kan og nevnes 1 IK St. Lungegårdsvann, Be. 7.-14.9 (DSH,FFA m.fl.). 1 IK Tveito, Granvin 6.10 er ny art for Granvin (O.T.Granvin).

Småspove *Numenius phaeopus*

Oktober til mars: 1 ind., årets første, Lønvatnet, Voss 1.5 (OHE,IMÅ,RVO).

Storspove *Numenius arquata*

Desember til februar: 1 ind. Herdla, As. 16.12 (THA,OMO). 1 ind. samme sted 4.1 (DGJ). 1 ind. Solberg, Øyg. 28.1 (HSA). 3 ind. Hjelme, Øyg. 1.2 (JBE). 2 ind; årets første trekkere, Svellingen, Øyg. 25.2 (HSA,JBE).

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Alle funn: 1 ad. Lygra, Lindås 5.6 (R.Lilleskare). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 24.7 (ATM). 1 S Vinappen, Fedje 12.8 (ABR,FFA,IFR m.fl.). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 15.8 (JBE). 3 IK Herdla, As. 16.8 (FFA,EFR). 1 IK Gjernesmoen, Voss 20.8 (OHE).

Rødstilk *Tringa totanus* [11/15-0/0] vinterfunn etter 1992

Desember til februar: Ingen funn i perioden. Årets første trekkere var 2 ind. Kjøel, Bømlo 9.4 (LØK).

Gluttsnipe *Tringa nebularia*

Hekkefunn og medio oktober til medio april: 1 ind., årets første, Melsvatnet, Voss 28.4 (OHE). 1 ind. Sævarhagsvikjø, Stord 6.-10.10 (THH).

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Alle funn: 1 ind. Grandane, Voss 21.-25.4 (OHE). 2-3 ind. Ulvikpollen, Ulvik 1.5

(OHE,ENY). 2 ind. Sandvin, Odda 3.5 (IMÅ). 1 ind. Herlandsnesjane, Osterøy 29.5 (FFA). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 23.7 (JBE). 2 S Eknes, Lindås 30.7 (MWI). 3 ind. Herdla, As. 30.7 (ABR,ATM). 1 ind. Herdla, As. 1.8 (ATM). 1 ind. Austevollshella, Austevoll 5.8 (OOV). 1 ind. Vaulen, Austrheim 8.8 (MWI). 1 S Vinappen, Fedje 12.8 (ABR,FFA,IFR m.fl.). 1 ind. Skogsøy, Øyg. 15.8 (JBE). 2 S Grandane, Voss 17.8 (OHE). 1 ind. Leirvåg, Austrheim 24.8 (MWI).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Alle funn: 1 ind. Rekvesøyane, Voss 6.5 (OHE), og 2 ind. s. st. 7.5 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 11.8 (GJE). 2 ind. Tjeldstø, Øyg. 16.8 (JBE). 1 ind. Grandane, Voss 16.8 (OHE).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Oktober til medio april: 1 ind. årets første Gaupås, Be. 23.4 (FHP).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Alle funn: 2 ind. Isdalen, Eidfjord 4.6 (ATM). 1 ind. Myrkdalsdeltaet, Voss 27.6 (JOS).

Polarjo *Stercorarius pomarinus* [57/216-5/15]

Alle funn: Alle funn er nordtrekkende forbi Skogsøy, Øyg. 2 N 12.5, 2 N 20.5, 9 N 23.5, 1 N 28.5, 1 N 8.7 (JBE)

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Trekk: 1 N Skogsøy, Øyg. 20.5 (JBE). 1 N Skogsøy, Øyg. 23.5 (JBE). 1 ind. Herdla, As. 31.5 (GJE). Den minst tallrike joen på trekk i Hordaland. Arten hekker i varierende antall på Hardangervidda, men er ikke en årlig art i lavlandet eller ved kysten.

Storjo *Stercorarius skua*

Alle funn: 1 N Skogsøy, Øyg. 17.4 (JBE). 1 N samme sted 29.4 (NOF Bergen). 4 N

Skogsøy, Øyg. 23.5 (JBE). 2 S Algrøy, Fjell 13.7 (K.E.Vedahl). 1 N Skogsøy, Øyg. 20.7 (ATM). 2 N + 4 S Skogsøy, Øyg. 22.7 (ATM). 5 N Skogsøy, Øyg. 13.8 (JBE). 2 N samme sted 27.9 (ATM). 2 N Vinappen, Fedje 1.10 (NOF m.fl.). 1 ind. Vinappen, Fedje 11.10 (ABR,ATM).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis*
[14/14-1/1]

Alle funn: 1 ad; sett 6. og 20.12.2005 i Byparken, og 1.1.2006 i Store Lungegårdsvann. Fuglen ble sett ved flere anledninger i Byparken og Store Lungegårdsvann fram til 9.4 (F) (FFA,ABR,ENY,DSH). Fuglen var i år i sin 13. overvintring i Bergen! 1 2K Byparken

2K ringnebbmåke Larus delawarensis i Byparken, Bergen 16. mai 2007. Dette var den første nye fuglen i Bergen og Hordaland siden 1999, til tross for årlige ringnebbmåkebesøk i hele perioden. Denne fuglen holdt seg i Bergen gjennom hele mytesesongen. Foto: Frode Falkenberg.

og Tveitevannet, Be. 16.5-29.8 (F) (FFA m.fl.). Sistnevnte fugl er den første nye ringnebbmåke som blir oppdaget i Bergen siden januar 1999! Fuglen holdt seg sentrumsnært gjennom hele sommeren, og ga observatørene en gylden mulighet til å se en sjelden fugl forandre utseendet fullstendig gjennom mytingen fra første til andre vinterdrakt. Funnet er innsendt, mee ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Fiskemåke *Larus canus*

Vinte- og trekk-konsentrasjoner: 250 ind. Strandebarm, Kvam 9.3 (OOV). 3600 N Skogsøy, Øyg. 30.3 (JBE). 375 ind. Herdla, As. 26.-30.11 (MFR,THA,OMO). 300 ind. Herdla, As. 23.12 (EFR,THA).



Sildemåke *Larus fuscus*

November til medio mars og graellsii: Årets første fugl var 1 ad. St. Lungegårdsvann, Be. 26.3 (ABR). Av andre nevneverdige observasjoner har vi 1 2K Tveitevannet, Be. 20.5* (F) (FFA). 2005: 1 2K 9.6-19.7* (F) Grandane, Voss (OHE). Det foreligger kun to tidligere funn av denne aldersklassen i Hordaland, hhv. i Åsane, Bergen 20.7.2001 og Møhlenpris, Bergen 28.5-7.6 2002. Ettårige sildemåker returnerer som regel ikke til Norge om sommeren, men oppholder seg enten i overvintringsområdene i blant annet Marokko og Portugal, eller noe lenger nord det første året.

Grønlandsmåke *Larus glaucooides* [34/35-1/1]

Alle funn: 1 2K St. Lungegårdsvann, Be. 10.1* (F) (ENY).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

Allefunn: 14K Eidesvik, Bømlo 4.2 (PMA). 1 2K Byparken, Be. 12.2 (ABR,FFA). 1 3K S Skogsøy, Øyg. 29.3 (JBE). 1 2K N samme sted 5.4 og 1 2K N 8.4 (JBE). 1 ad. N Skogsøy, Øyg. 13.4 (JBE). 1 2K; første funn i Odda, Sørfjorden, Odda 22.4 (DGJ,MFR m.fl.). 1 ad. S Skogsøy, Øyg. 18.11 (JBE).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Medio oktober til medio april, samt 2K og 3K: 24 ind., årets første, Skånevik, Etne 28.4 (RVO).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Medio oktober til medio april, samt 2K og 3K: Ingen funn i perioden. Årets første trekkere er 3 ind. Skogsøy, Øyg. 6.5 (JBE).

Lomvi *Uria aalge*

Hekkefunn og innlandsfunn: 2 ind. St. Lungegårdsvann, Be. 20.-22.3 (DSH).

Teist *Cephus grylle*

Innlandsfunn: 1 ind; ny art for Odda, Havnebasenget, Odda 22.8 (RVO).

Alkekonge *Alle alle*

Innlandsfunn, og funn mai til august: 1 ind. Rotevatnet, Øyg. 20.10 (JBE).

Skogdue *Columba oenas* [17/17-1/2] etter 1970

Alle funn: 2 ind; trolig par, Ulvikpollen, Ulvik 30.4* (F) (OHE,ENY). 1 ind. fortsatt på plass samme sted 1.5 (OHE,ENY m.fl.).

Ringdue *Columba palumbus*

Vinteransamlinger: 30 ind. Norheimsund, Kvam 17.12 (JMO). 15 ind. Eldøy, Stord 20.12 (THH).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Hekkefunn: Ingen hekkefunn rapportert, men arten finnes i moderate antall både i Bergen, Os og trolig noen andre kommuner som for eksempel Sveio og Etne. Vi ønsker å få en oversikt over artens utbredelse i fylket, og ønsker alle observasjoner av fugler i hekketiden. Vi tar også med 1 ind; andre funn for Eidfjord, Måbødalen, Eidfjord 21.5 (ATM). 1 ind; sannsynligvis samme som 21.5 Øvre Eidfjord, Eidfjord 24.6 (ATM).

Turteldue *Streptopelia turtur* [55/58-1/1]

Alle funn: 1 1K Hjellestad, Be. 24.-28.9* (F) (Ø.Varpe).

Mongolturteldue *Streptopelia orientalis* [1/1-1/1]

Alle funn: 1 1K Stormark, Fedje 11.10 (F) (KJO,ABR,FFA). Evt. andre funn i Hordaland. Fylkets første mongolturteldue stammer fra Valestrandsfossen på Osterøy 13. november 1903. Denne fuglen ble skutt og underartsbestemt til *S. o. meena*. Årets fugl ble dessverre ikke sett godt nok til å underartsbestemmes. Funnet er forøvrig nærmere omtalt av Johannesen (2006).



Denne fjorårsungen (2K) av sildemåke *Larus fuscus* representerer bare det fjerde funnet av aldersklassen i Hordaland. Foto: Frode Falkenberg.

Gjøk *Cuculus canorus*

Oktober til medio april: 1 ind. hørt Lerøy, Sund 29.4 var årets første fugl i fylket (N&G.Nesse). Aprilfunn er for øvrig langt fra årlig i Hordaland.

Haukugle *Surnia ulula*

Alle funn: 1 ind. Håland, Etne 21.1 (RVO). 1 ind. Taulevågen, Radøy 11.2 (K.Skarsvåg). 1 ind. Stokksel, Granvin 1.3 (S.H.Pedersen). 1 ind. Fonnastøl, Odda 11.3 (IMÅ). 1 ind. Vintertun, Odda 1.4 (I.Hildal). 1 ind. Garen, Eidfjord 28.4 (ATM). Seks individer på et år gjør at 2006 går inn i historiebøkene som det beste året for arten siden LRSK la om rapportformatet sitt i 1997.

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Alle funn: 1 sy. Svelgane, Voss 5.4 (OHE). 1 ind. Svelgane, Voss 19.9 (JDJ,OHE,JOS).

Artens eneste sikre og årlige lokalitet i Hordaland.

Jordugle *Asio flammeus*

Alle funn: 1 ind. Austrheim, Austrheim 27.5 (OWS). 1 ind. Hardangervidda, Eidfjord 30.6 (SKV,IMÅ,OMO m.fl.). 1 N Hellesøy, Øyg. 14.10 (ECH).

Perleugle *Aegolius funereus*

Alle funn: 1 hukrende Morland, Fjell 28.2-11.3 (C.Braham m.fl.). Hukrende perleugler observeres uhyre sjeldent utenfor barskogsområdene i de indre delene av fylket.

Tårnseiler *Apus apus*

Oktober til april: 1 ind; årets første var på Skogsøy, Øyg. 7.5 (JBE).



Fylkets første mongolturteldue Streptopelia orientalis på over 100 år viste seg kort på Stormark, Fedje ved et par anledninger om ettermiddagen 11. oktober 2006. Foto: Kjetil Johannesen.

Hærfugl *Upupa epops* [41/41-2/2]

Alle funn: 1 ind. Hetlevikåsen, Be. 20.8* (A.Hauge). 1 ind. Hallaråker, Bømlo 15.-16.9* (F) (OHA).

Svartspett *Dryocopus martius* [21/21-1/1]

Alle funn: 1 ind. 29.10 Gjernesmoen, Voss (OHE). Første funn av arten i Hordaland siden en fugl var på Voss i slutten av september 1988.

Vendehals *Jynx torquilla*

Alle funn: 1 sy. Eknes, Lindås 14.-15.6 (MWI). 1 par; hekket i rugekasse Løyning, Odda 27.6 (I.Løyning). 1 ind. Vinappen, Fedje 28.9 (ATM). 1 ind. Kirkegården, Fedje 30.9 (ATM).

Sanglerke *Alauda arvensis*

Medio november - januar: 2 ind. Herdla, As. 4.-7.1 (DGJ m.fl.). 4 ind. Herdla, As. 18.-31.1 (BAN,DGJ m.fl.). Årets første trekkere var 8 ind. Herdla, As. 11.3 (NOF Bergen). Fra desember finner vi 5 ind. Herdla, As. 2.12 (EFR,OMO). 1 ind. Flesland, Be. 25.12 (THA). 5 ind. Herdla, As. 16.-30.12 (THA,OMO m.fl.).

Sandsvale *Riparia riparia*

Medio oktober - mars: Ingen funn i perioden. Årets første trekker var 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 23.4 (ABR,GHÖ).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Medio oktober - mars: Årets første var 1 ind. Gåsland, Bømlo 4.4 (KKA). Fra rapportperioden har vi; 2 ind. Herdla, As. 18.10 (EFR,OMO). 1 ind. Sentrum, Voss 21.10 (OHE).

Taksvale *Delichon urbica*

Medio oktober - mars: Ingen funn i rapportperioden. Årets første trekker var 1 ind. Nesttun, Be. 26.4 (AHÅ).

Tartarpiplerke *Anthus novaeseelandiae* [69/103-2/2]

Alle funn: 1 ind. Hiskjo, Bømlo 1.10* (LØK). 1 ind Koppen, Fedje 14.10* (ATM).

Trepiplerke *Anthus trivialis*

Oktober - medio april: Årets første; 1 ind. Vatna, Stord 30.4 (THH). Oktober; 1 ind. Nygård, Fedje 1.10 (OHE). 1 ind. Kirkevågen, Fedje 1.10 (FFA). 1 ind. Stormark, Fedje 10.10 (FFA).

Heiplierke *Anthus pratensis*

Desember - februar: Ingen funn i rapportperioden. Årets første trekkere var 2 ind. Austrheim, Austrheim 2.3 (O.W.Süren).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

Desember - februar, innlandsfunn: Årets første trekkere var 28 ind. Herdla, As. 10.3 (FFA). 1 ind; ny art for Eidfjord kommune, Sentrum, Eidfjord 3.4 (ATM).

Gulerle *Motacilla flava*

Alle funn: 1 ind; årets første, Melsvatnet, Voss 28.4 (ECH). 1 F Myrkdalsdeltaet, Voss 16.7 (OHE). 1 ind. Sandvin, Odda 13.8 (IMÅ). 10 ind. Garen, Eidfjord 13.8 (ATM). 5 ind. Øvre Eidfjord 16.8 (ATM). 1 ind. Prestegardsmoen, Voss 22.8 (OHE). 2 ind. Prestegardslandet, Voss 22.8 (OHE). 1 ind. Gjernesmoen, Voss 22.8 (OHE). 3 ind. Herdla, As. 26.8 (BAN,THA,OMO). 3 1K Grandane, Voss 28.8 (OHE). 6 ind. Grandane, Voss 29.8 (OHE). 7 ind. Herdla, As. 29.8 (JOP). 5 1K Gjernesmoen, Voss 30.8 (OHE). 4 ind. Sandvin, Odda 30.8 (IMÅ,RVO). 1 ind. Seimsvatnet, Voss 3.9 (OHE). 5 ind. Gjernesmoen, Voss 3.9 (OHE). 3 1K Herdla, As. 3.9 (THA,ENY

m.fl.). 1 ind. Haugamoen, Voss 9.9 (OHE). 1 ind. Herdla, As. 11.9 (OWJ). 1 ind. Herdla, As. 23.9 (BAN,THA m.fl.). 3 ind. samme sted 24.9 (ABR,FFA). Engelsk gulerle *Motacilla flavissima*: 1 ind. Kjøll, Bømlo 29.4* (F) (OHA). Det foreligger kun to tidligere funn av *flavissima* i Hordaland, hhv. fra Flesland, Be. i juni 1976 og Stend, Be. juni 1977.

Vintererle *Motacilla cinerea*

Alle funn: Kommunevis fordeling av funnmassen: Askøy: Arten er kun påvist på Herdla høst og vinter. 1 ind. 10.12.06-19.2.07 (THA,BAN m.fl.). 2 ind. 23.10 (MFR). 2 ind. 27.10 (OHE). 1 ind. 18.11 (BAN,DGJ). 1 ind. 26.11 (MFR,THA). Bergen: 1 ind. Byparken 6.1 (JDJ). 1 ind. Klokkavatnet 5.3 (ABR,GHÖ). 1 sy. Birkelandsbotn 29.5 (GKJ). 1 par; med 2 store utflytne unger Arnaelva 3.6 (OOV). 1 par; med 2 store utflytne unger Bukkedalen 3.6 (OOV). 1 ind. Fanaelva 3.6 (OOV). 1 ind; varslende Øvsttunstemma 3.6 (OOV). 1 1K Møllendalselven 3.11 (DSH). 1 ind. Danmarks plass 17.12 (TSV). Eidfjord: 1 ind. Øvre Eidfjord 31.3 (ATM). 1 ind. Øvre Eidfjord 10.-11.4 (ATM). 1 ind. Eio (nedre del) 20.4 (ATM). 1 ind. Måbødalen camping 9.5 (ATM). 1 ind. Øvre Eidfjord 23.9 (ATM). 1 ind. Øvre Eidfjord 7.10 (ATM). Fedje: 1 ind. Nygård 30.9 (OHE). 1 ind. Kirkevågen (OHE,GHÖ m.fl.). Granvin: 1 ind. Seim 6.4 (ATM). Odda: 1 ind. Sandvin 13.8 (IMÅ). 6 ind. Opo 11.9 (SOB). 2 ind. Sandvin 29.10 (RVO). Os: 1 F Oselva 6.5 (ABR,GHÖ). 1 ind. Søfteland 29.5 (BAN,DGJ,FHP). Sund: 1 S Golten 26.9 (ABR,GHÖ m.fl.). 1 ind. Marsteinen hotell 21.10 (S.Eldøy). Ullensvang: 1 ind. Aga 21.5 (KGR). Voss: Arten befester sin stilling i kommunen og observeres fra mars til desember. 1 ind; årets første Vosso 29.3 (OHE). Sees i april-mai på følgende lokaliteter: Vosso, Mossefinelva, Reppen, Gjernesmoen, Seimsvatnet, Haugo, Rekvessøyane, Melsvatnet, Grandane,

Nyre, Myrkdalen camping, Tintrabrua. Største ansamling i perioden er 7+ ind. Vosso 18.4 (OHE). Konstatert hekking med 1 M; med mat i nebbet Rekvesøyane 28.5 (ATM). 1 par; hekking Tintrabrua 29.5 (OHE). Arten sees deretter fra juli-des på stort sett de samme lokaliteter med første observasjon 1 ind. Myrkdalsdeltaet 16.7 (OHE). Siste observasjon er 2 ind. Vosso 2.12 (OHE). Største ansamling denne høsten var 4 ind. Gjernesmoen 2.10 (OHE).

Linerle *Motacilla alba alba*

November - februar: Årets første trekker var 1 ind. Nesvika, Unneland, Be. 1.4 (GGJ). Vi tar med noen gode trekk tall; 600 ind. Prestegardslandet, Voss 22.8 (OHE), 500+ Grandane, Voss 29.8 (OHE) og 140+ Herdla, As. 26.8 (BAN,THA,OMO). Fra rapportperioden finner vi 2 ind. Måge, Ullensvang 25.11 (J.A.Måge) og 1 ind. Sandvin, Odda 17.12 (IMÅ).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*

Alle funn: 1 ind; årets første Herdla, As. 25.3 (THA,GJE). 2 M Herdla, As. 28.3 (DGJ). 1 ind. Tjeldstø, Øyg. 29.3 (ECH). 1 M Herdla, As. 30.3 (OMO). 3 M Herdla, As. 11.4 (DGJ). 1 M Gåsland, Bømlø 13.4 (LØK). 1 M Herdla, As. 14.-16.4 (DSH,DGJ). 1 M Heggøyana, Øygarden 23.4 (ABR,GHÖ). 1 M Herdlevær, Øyg. 24.4 (IFR,MFR,THA). 1 M Tjeldstø, Øyg. 23.-26.4 (ABR,GHÖ,THA). 1 M Herdla, As. 26.4 (JDJ). 1 F Ådlandsvatnet, Stord 28.4 (THH,T.Heggland). 1 M Skogsøy, Øyg. 9.5 (FFA). 1 F; eller hybrid med vanlig linerle, Garen, Eidfjord 20.-21.5 (ATM). Årets forekomst på minst 14 individer er den dårligste siden 2000, da det bare ble observert 12 svartryggerler i Hordaland.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Alle funn: Småflokker ble sett jevnlig i hele fylket fra nyttår til medio april. Den

kommunevis fordelingserslikut: Bergen 144 ind., Ullensvang 108 ind., Osterøy 40 ind., Eidfjord 23 ind., Samnanger 17 ind., Kvam 11 ind., Kvinnherad 7 ind., Sund 7 ind., Stord 6 ind., Odda 6 ind., Voss 5 ind., Lindås 3 ind., Os 2 ind., Jondal 2 ind. og Bømlø 1 ind. Seine funn i vårhalvåret var 10 ind. i Bruvikdalen, Osterøy 24.4 (TBR), 25 ind. Eknes, Lindås 25.-29.4 (MWI), 1 ind. Tokheim, Odda 29.4 (A.Målsnes) og 1 ind. Skutle, Voss 5.5 (J.O.Sagerøy). Høstens første observasjon var 3 ind. som dukket opp i Knarvik, Lindås 20.10 (MWI). Utover høsten ble arten registrert over hele fylket, og dette høsthalvåret fikk innlandsstrøkene en god andel av funnene: Voss 270 ind., Stord 148 ind., Eidfjord 82 ind., Odda 50 ind., Øygarden 40 ind., Askøy 27 ind., Ullensvang 11 ind., Lindås 3 ind., Bømlø 1 ind. og Sund 1 ind. Tilsammen ble det altså registrert ca. 630 sidensvans i fylket høsten 2006.

Fossefall *Cinclus cinclus*

Ytre kyststrøk: 1 ind. var ved Hjelme Vest, Øyg. 18.3 (THA,OHE)

Jernspurv *Prunella modularis*

Medio november - medio mars: Vinterfunn var 1 ind. På Leite, Bømlø, 23.12.06-2.1.07 og 1 ind. samme plass 12.2 (GOL). Årets første trekker var et sy. ind. på Flesland, Be. 2.4 (THA). På Voss ble første ind. hørt sy. 18.4 (OHE), og i Eidfjord ble første ind. sett 28.4 (ATM).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Oktober - april, trekk: Årets første var 4 M i Isdalen, Eidfjord og 1 M på Garen, Eidfjord 10.5 (ATM), mens 1 sy. M var på Rekvesøyane, Voss, 12.5 (OHE). På høsten ble to individer sett på trekk i lavlandet; 1 1K M i Kalandsviken, Be. 19.8 (FFA), og 1 1K på Herdla, As. 26.8 (BAN,THA,OMO). I tillegg ble 1 1K sett på Lønaøyane, Voss, 3.9 (OHE).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*
[35/39-1/1]

Alle funn: Årets eneste funn var 1 F Turøy, Fjell 23.4* (F) (ABR,GHÖ).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

November – medio april, hekkefunn: Ingen funn i rapportperioden, men årets første var på Garen, Eidfjord 6.5 (ATM).

Buskskvett *Saxicola rubetra*

November – medio april: Årets første var 1 M på Garen og 1 M på Maurset, Eidfjord, 4.5 (ATM).

Svartstrupe *Saxicola torquata* [41/70-2/4]

Alle funn: 2 M Lauvøy, Austrheim 29.-30.9* (F) (ABR,FFA,MFR m.fl), M+F Ågotnes, Fjell 1.10 (TLI)*, og igjen M+F Ågotnes, Fjell 30.12* (MFR). Begge lokalitetene er kjente svartstrupeplasser, og har gode habitater. Det blir spennende å følge disse områdene framover, tatt i betraktning artens etablering på Vestlandet de siste åra.

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Medio oktober - mars: Årets første var 1 ind. på Hallaråker, Bømlo 9.4 (OHA) og 1 ind. på Golten, Sund 9.4 (MFR)

Haukugle Surnia ulula på Garen, Eidfjord 28. april 2006. Foto: Alf Tore Mjøs.



Ringtrost *Turdus torquatus*

Medio november – mars: Årets første var i Langevåg, Bømlo 9.4 (RHO). Store våransamlinger inkluderer 29 ind. Bordalen, Voss 22.4 (OHE), 20 ind. Øvre Eidfjord 22.4 (ATM), 45 ind. Vintertun, Etne 29.4 (RVO), 20 ind. Bordalen, Voss 30.4 (OHE,ENY) og 15 ind. Garen, Eidfjord 30.4 (OHE,ENY). Eneste høstobservasjon langs kysten var 1 ind. på Stormark, Fedje 13.10 (ENY).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Utvalgte funn: Fra vinter og vår har vi følgende store ansamlinger; 60 ind. Breivik, Øy. 25.1 (DGJ), 70 ind. Nedre Økland, Stord 2.2 (THH) og 1500 ind. Saue Camping, Voss 28.4 (OHE). Som vanlig bidrar Voss kommune med store antall om høsten: 1200 S på to timer 5.10 ved Grandane, 4500 stasjonære ind. ved Grandane 7.10 og 5000 S i løpet av 40 min. ved Gjernesmoen 29.10

Måltrost *Turdus philomelos* [6/7-1/1] vinterfunn etter 1992

Desember - februar: Årets første sy. ind. var på Innvær, Bømlo 29.3 (GOL). 3 ind. på Gjernesmoen, Voss 9.12 var seint for arten (OHE), og samtidig det første vinterfunnet i fylket siden januar 2003.

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Desember - februar: Fra nyttår og utover i januar holdt det seg flere småflokker i Hordaland: I Nygårdsparken, Be. var det opptil 25 ind. fra nyttår til 7.2. 75 ind. var på Radøy Vest, Radøy 1.1 (ABJ), 25 ind. var på Flesland, Be. 1.1 (THA), 15 ind. var ved Fløibanen, Be. 8.1 (O.Sætre), 16 ind. var på Herdla, As. 21.1 (IFR,THA,OMO), 15 ind. var på Breivik, Øy. 25.1 (DGJ), 25 ind. var på Skjold, Be. 29.1 (GGJ), 14 ind. var i Christieparken, Be. 30.1 (FFA), 20 ind. var i Alversund, Lindås 11.2 (HBJ) og 22 ind. var på Herdla, As. 11.2 (DGJ). 15 ind. på Breivik, Øy. 15.3 (JBE) kan ha vært vårens

første trekkere. Store høstansamlinger var 6200 ind. S kl. 9-11 på Grandane, Voss 5.10 (OHE), 500 stasjonære ind. Grandane, Voss 7.10 (OHE) og 3500 S Fedje 15.10 (ATM,OHE,ENY). Vinteransamlinger var 30 ind. Blomsterdalen, Be. 11.12 (THA) og 25 ind. Rommetveit, Stord 27.12 (THH).

Duetrost *Turdus viscivorus*

Alle funn: Årets første var 1 på trekk N ved Kollsnes, Øy. 2.3 (KPG), og dette var ny ekstremumstid for fylket. Forøvrig var det lav forekomst i Øygarden med kun ett ind. i tillegg til overnevnte; Herdlevær 29.3 (ECH). Voss kommune hadde 3 funn med 4 ind. på Almeland og 3 ind. på Reppen 13.4 (IFR,MFR,THA), samt 1 ind. på Almeland 17.4 (OHE). Eidfjord hadde også 3 funn med 2 ind. Øvre Eidfjord 3.4, 1 ind. Tveit 25.4 og 1 ind. Garen 9.5 (ATM). Øvrige funn: 1 ind. holdt seg på Sandvin, Odda 30.-31.3 (IMÅ,RVO), 1 ind. ved Hatlestad, Be. 16.4 (ATM), 1 ind. ved Eidsheim, Lindås 27.4 (TSV), og 1 ind. 29.5 ved Herlandsnesjane, Osterøy (FFA).

Gresshoppesanger *Locustella naevia* [68/73-3/3]

Alle funn: 1 ind. sang ved Kalandsvatnet, Be. 9.-17.5 (JOP m.fl.), og 11.5 var det 2 sy. tilstede et par hundre meter fra hverandre (ABR,FFA). 1 sy. var også ved Rimbareidtjøno, Fitjar 15.5 (THH).

Gulsanger *Hippolais icterina*

Oktober - april: Årets første var 1 ind. på Nyborg, Be. 17.5 (TLI). Et godt tall var 8 ind. som sang ved Myrkdalsdeltaet, Voss 13.6 (OHE).

Hauksanger *Sylvia nisoria* [30/33-1/1]

Alle funn: Årets eneste var 1 IK ved Herdlevær, Øyg. 11.10* (MFR). Den noe seine datoen er typisk for hauksangere som oppdages i felt. Trolig er frekvensen av hauksangere i fylket vårt langt høyere i slutten av august og begynnelsen av september, men mye løv på trær og busker,



2006 ble nok et toppår for gulbrynsangeren *Phylloscopus inornatus* i Hordaland, med 33 ind. registrert. Dessverre er arten betydelig underrapportert. Fuglen på bildet var på Mulen, Fedje 10. oktober 2006. Foto: Frode Falkenberg.

fuglenes sky atferd og lite ringmerking i kyststrøkene bidrar nok til stor underrapportering.

Møller *Sylvia curruca* [149/163-18/19]

Alle funn: Årets første var 1 sy. ind. på Sture, Øy. 14.5 (JOP), og deretter 1 sy. ind. i Knarvik, Lindås 19.-24.5 og 1 ind. sy. samme sted 19.5-12.6 (MWI). I Meland var det 1 sy. ind. på Husebø og 1 sy. ind. på Skjelanger 25.5 (FFA). Flere syngende fugler ble hørt i begynnelsen av juni: Telavåg, Sund 4.6 (FFA), Leite, Bømlø 5.6 (GOL), Lygra, Lindås 7.6 (FHP), Tjeldstø, Øy. 9.-10.6 (THA,JBE), og Fønnes, Austrheim 11.6 (JOP). Seinere observasjoner i vårhalvåret var 1 sy. ind. Muthaugtjern, Be. 25.6 (THA) og 1 sy. ind. Algrøy, Fjell 10.7 (K.E.Vedahl). Årets første høst-trekker ble sett på Garen, Eidfjord

18.8 (ATM). Deretter fulgte Kalandsviken, Be. 19.8 og 25.8 (FFA,BBE), Herdlevær, Øy. 27.9 (ATM), 2 ind. Kirkevågen, Fedje 30.9 (NOF m.fl.) og 1 ind. Vassivarvatnet, Fedje 15.10 (OHE,ENY). Det beste året etter årtusensskiftet i Hordaland.

Tornsanger *Sylvia communis*

Oktober - april: Årets første var 1 ind. på Tjeldstø, Øy. 6.5 (JBE) og 1 ind. på Storetveit, Be. 6.5 (JPS). 1 ind. på Fet, Eidfjord 2.5 (ATM), 1 ind. på Grandane, Voss 23.5 (OHE) og 1 ind. på Rene, Voss 8.7 (ATM) er uvanlige funn i de respektive kommunene. 1 ad. M på Kremmerholmen, Fedje 29.-30.9 (ATM,OHA,RVO m.fl.) og 1 ind. på Koppen, Fedje 15.10 var seine funn.

Hagesanger *Sylvia borin*

Oktober - april: Årets første var ved Nyborg i Åsane, Be. 7.5 (TLI). Seine høstobservasjoner var 5 ind. Fedje 30.9 (NOF m.fl.), 1 ind. Fedje 13.10 (ATM, TLI) og 1 ind. Krossøy, Austrheim 16.10 (MWI).

Munk *Sylvia atricapilla* [117/134-24/24] vinterfunn etter 1992

Medio november - medio april: Fra nyttår til begynnelsen av april har vi følgende kommunevise fordeling: Bergen 7 ind., Stord 3 ind., Odda 3 ind. og Bømlo 1 ind. Flere av disse ble sett i tilknytning til vinterforinger. Fedje viste en meget sterk høstsesong med bla. 60 ind. 10.10. I Bergen ble 3 seine ind. sett, Voss kunne fremvise 4 ind. og Øygarden, Kvam og Lindås hadde 1 ind. hver. Året 2006 representerer dermed den nest beste vinteropptreden av munk etter 1993, bare slått av toppåret 2001 da hele 29 ind. ble registrert i fylket.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus* [92/98-27/33]

Alle funn: Igjen et sterkt år for arten i Hordaland, mye takket være jevnlig dekning på Fedje i løpet av høsten. Dessverre opplever LRSK at bare deler av antall rapporterte fugler kommer inn til behandlinga va komiteen... Vi starter med Fedje som hadde 23 funn av 29 individer i perioden 23.9-15.10* (F) (mange observatører). Øvrige funn: 1 ind. Hiskjo, Bømlo 22.9* (LØK), 1 ind. Herdlevær, Øygarden 1.10* (DGJ, TLI) og 1 ind. på Turøy, Fjell følgende datoer: 1.10*, 15.10* og 17.10* (DGJ, JDJ, MFR). Fuglene fra 15. og 17.10 regnes som samme ind. 33 ind. i løpet av året er en tangering av antallet i fjor, noe som var tidenes beste opptreden i Hordaland da.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Alle funn: Årets første var 1 sy. ved Årstad, Be. 4.5 (DSH), etterfulgt av 1 sy. ved Nyre, Voss 7.5 (OHE). Vi er ikke

bortskjemte med kyst-observasjoner av trekkende bøksangere her i Hordaland; 1 ind. i ”bombehagen” på Herdlevær, Øyg. 21.8 gledet observatørene (JBE, JDJ)

Gransanger *Phylloscopus collybita*

November - mars: 1 ind. på Grandane, Voss 13.4 (ECH) var årets første, etterfulgt av 4 sy. ved Flesland, Be. 15.4 (THA).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Oktober - medio april: De første ind. ankom 26.4: 1 tidlig ind. var ved Eidfjordvatnet, Eidfjord 26.4 (ATM), og et annet ind. var på Gaupås, Be. (AHÅ). Den varme høsten 2006 bidro til svært mange seine observasjoner av arten, særlig utmerket Fedje seg: Flere dager i oktober hadde 1 ind., og mer enn 1 ind. ble loggført følgende dager; 10 ind. 30.9, 2 ind. 8.10 og hele 6 ind. 10.10. Siste observasjonsdato var 1 ind. 15.10. Øvrige funn: 1 ind. Haugamoen, Voss 4.10 (OHE), 2 ind. Algrøy, Fjell 8.10 (ABR, GHÖ) og 1 ind. Hallaråker, Bømlo 14.10 (OHA). En god oktoberopptreden for arten i Hordaland.

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Oktober - april: Årets første var ved Prestegardsmoen, Voss 8.5 (OHE).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* [13/13-1/1]

Alle funn: Årets eneste satt godt gjemt i en tett hekk ved fotballbanen på Fedje 23.9* (OHE, JOS). Arten ble ikke sett i Hordaland i 2004 eller 2005.

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Oktober - medio april: Årets første var 1 M ved Leirvik, Stord 25.4 (EJR). Seine observasjoner av arten inkluderer 1 ind. på Nygård, Fedje 30.9-1.10 (ABR, FFA, MFR m.fl.) og 1 1K på Fedje 10.10 (ABR, FFA, JOP).

Tornskate *Lanius collurio*

Alle funn: Med tre funn i fylket i 2006 var dette litt over gjennomsnittet for de seinere åra. Årets første var 1 F på Halne, Eidfjord 4.6 (ATM,N.Bowman), og dette var 2. funn i kommunen. 1 F ble sett på Herdlevær, Øyg. 4.7 (JBE) og 1 ad. M ble sett på Herdla, As. 22.9 (KAU,KHA). Sistnevnte er en hos oss meget spesiell observasjon, da de aller fleste tornskater så seint om høsten dreier seg om ungfugler.

Rosenvarsler *Lanius minor* [0/0-1/1]

Alle funn: 1 ad. ved Kvåle, Voss 20.8 (F) (OHE). Dessverre forsvant fuglen bare minutter før de første ornitologene fra Bergen ankom. Fuglen vil representere fylkets første funn av arten. Observasjonen er omtalt av Heggøy (2006). Det foreligger 24 funn fra Norge sett under ett fram tom. 2005 (Olsen og Mjølssnes 2007). Funnet fra Voss er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Varsler *Lanius excubitor*

Alle funn: 5 funn i Hordaland i 2006: 1 ind. var på Flesland, Be. 1.-8.4 (THA), 1 ind. var på Flesland, Be. 6.6 (NTL), høstens første var 1 ringmerket ind. Øvre Eidfjord, Eidfjord 20.9 (ATM), 1 ind. var i brannfeltet på Sveio 21.10 (EFR,LFR), og 1 ind. var på Njåstad, Osterøy 22.11 (MFR).

Kaie *Corvus monedula*

Utvalgte funn, hekking: 2 ind. Garen, Eidfjord, 10.5 (ATM) og 8 ind. var på Bjørke, Voss, 30.12 (OHE). En relativt uvanlig art i indre strøk av Hordaland.

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Alle funn: 3 funn i Bergen i 2006: 1 2K Stend 8.4 (BAN,T.Sivertsen), 2 ind. Unneland, Bergen 18.4 (GGJ) og 1 ad. Solheimsvatnet 24.12 (ATM). Øygarden hadde to funn; 1 ind. Kollsnes 4.5 (GJE) og 1 ad. Tjeldstø 1.11 (JBE), det samme hadde Askøy; 1 2K 16.1 (DGJ) og 1 1K

12-19.11 (THA,OMO mfl.) Øvrige funn; 1 ind. Austrepollen, Kvinnherad 31.3 (RVO), 1 ad. Jordbruksskolen, Voss 2.-3.12 (OHE) og 1 ad. og 1 1K Bjørke, Voss 30.12 (OHE).

Ravn *Corvus corax*

Utvalgte funn: Bjørke søppelplass på Voss har tidligere underholdt svært høye antall med ravn, og 430 ind. 5.3 (OHE) føyer seg pent inn i rekken av slike observasjoner.

Stær *Sturnus vulgaris*

Utvalgte funn: Fra nyttår til 11.2 ble det observert opptil 70 ind. på Herdla, As. 10 ind. var på foringsplass på Gåsland, Bømlo 19.1 (LØK), 30 ind. var på Tjeldstø, Øy. 20.-21.1 (JBE) og 25 ind. var på Husebø, Meland 11.2 (ABJ). Mot slutten av desember ble det observert opptil 130 ind. på Herdla, As., og 40 ind. var i Fanafjellsvegen, Be. 23.12 (BAN).

Rosenstær *Sturnus roseus* [16/16-1/1]

Alle funn: 1 1K ble fotografert på Turøy, Fjell 14.10 (JOP) og var årets eneste observasjon fra fylket. De senere årene har Hordaland vist en god opptreden av arten med tre funn i 2005, to funn i 2003 og tre funn i 2002. Årets funn er innsendt, men ikke ferdigbehandlet av NSKF.

Gråspurv *Passer domesticus*

Utvalgte funn: 80 ind. var et høyt antall ved Bjerke søppelplass, Voss 5.3 (OHE).

Pilfink *Passer montanus*

Alle funn: Fra nyttår til 30.1 holdt det seg opptil 6 ind. på Øvre Hageby, Stord (RNY), og 2 ind. var på Leite, Bømlo 22.1 (GOL). Hele 30 ind. var på Tjeldstø, Øy. 16.8 (JBE) og 1 ind. var i Kirkevågen, Fedje 30.9 (FFA). I slutten av desember holdt det seg opptil 5 ind. på Nedre Økland, Stord (THH). Arten er underrapportert, men det er ingen tvil om at Øygarden har fylkets største hekkebestand.

Bokfink *Fringilla coelebs*

Utvalgte funn: 1 sy. M på Prestegardsmoen, Voss 19.3 (OHE) var muligens en av de første trekkerne i år. 200 trakk S fra kl. 9-11 ved Grandane, Voss, 5.10 (OHE). På Haugamoen, Voss, var det 10 ind. 20.12 (OHE). Arten er dessuten fast inventar i Bergens parker vinterstid, med et par dusin fugler. Dessuten en fåtallig overvintrer langs hele Hordalandsystemen.

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Utvalgte funn: Det som kan ha vært en av årets første trekkere ble sett 30.3 ved Sandvin, Odda (IMÅ). 3200 trakk S i løpet av 2 timer 5.10 ved Grandane, Voss (OHE). På Haugamoen i samme kommune var det 30 ind. 20.12 (OHE)

Stillits *Carduelis carduelis*

Alle funn: Fra nyttår til 15.1 var det opptil 3 ind. på foringsplass i Alversund, Lindås (ABJ). 2.1 var det 2 ind. på Herdla, As. (ABJ), og 26.1 var det 3 ind. samme plass (DGJ). 10 ind. besøkte Vorland, Bømlo 10.1 (PMA), og foringsplassen på Gåsland, Bømlo hadde 30 ind. 18.1 og 50 ind. 27.1 (LØK). 4 ind. hadde tilhold i Alverstraumen, Lindås fra nyttår til 27.1. 5 ind. besøkte Eldøy, Stord 2.2 (THH), 3 ind. var på Leite, Bømlo 5.2 (GOL), 25 ind. var på Hallaråker, Bømlo 12.2 (OHA) og 1 ind. var på Brattholmen, Fjell 22.2 (THA). Årets første høstobservasjon var 2 S Kollsnes, Øygarden 8.8 (KPG). Arten er meget sjelden i august. Fra slutten av oktober til nyttår ble det gjort en rekke observasjoner langs kysten. Kommunevis fordeling: Øygarden; 2 ind. Herdlevær og 6 ind. Breivik 22.10 (JDJ, FFA m.fl.), 4 ind. Herdlevær 2.11 og 10 ind. Herdlevær 3.11 (FFA m.fl.). Bømlo: På Hallaråker ble det sett 5 ind. 20.10, 7 ind. 12.11, 9 ind. 17.12 og 20 ind. 23.12 (OHA), i tillegg ble det sett 1 ind. på foringsplass på Leite 11.12 (GOL). Fjell: På Ulvseth ble det sett 12 ind. 17.11 (JOP) og 10 ind. 30.12 (MFR).

Lindås: 1 ind. på foringsplass Alversund 9.12 (ABJ) og 4 ind. Osterfjorden 31.12 (MWI). 1 Odda besøkte 4 ind. Sandvin 12.11 (IMÅ, RVO), og dette var ny art for denne godt besøkte lokaliteten.

Tornirisk *Carduelis cannabina*

November - mars: De første trekkfuglene ble sett 9.4 med på følgende lokaliteter; 1 ind. Golten, Sund (MFR), 2 ind. Hiskjo, Bømlo (LØK) og 1 ind. Herdla, As. (THA).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Desember - februar: Årets første; 4 trekkere var ved Hiskjo, Bømlo 9.4 (LØK).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Alle funn: Fra nyttår og til slutten av februar huset Nygårdsparken, Be. 11+ ind. 1 ind. besøkte lokaliteten 31.3 (FFA), og 2+ ind. var tilstede 6-7.4 (FFA). Høstens første dukket opp 22.11 (FFA). Utover vinteren ble 2 ind. sett 4-26.12 (FFA) og 5 ind var på plass 26.12 (HSA). Som vanlig hadde Stord også en del funn; 1 ind. var på Øvre Hageby 20.12.06-30.1.07 (RNY), 2 ind. besøkte Eldøy 25.1 (THH), hele 10 ind. var på Grimsåsen 12.2 (THH, J.Losnegård) og 1 ind. var på Rommetveit 31.12 (THH,AVA). Øvrige funn: 4 ind. Åstveit, Be. 1.1 (EFR), 1 ind. Øvrehagen, Eidfjord 19-20.1 (MHA), 2 ind. Sentrum, Os 2.2 (L.Fagerheim), 1 ind. Sekse, Ullensvang 26.2 (IMÅ), 2 ind. Christieparken, Be. 1.3 (FFA), 1 ind. Hop, Be. 4.3 (GGJ), og 1 ind. Seim, Lindås 5.5 (MWI)

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Trekk og vinter: Årets første var 1 ind. på Sandvin, Odda 17.4 (IMÅ). Øvrige vartrekere var 1 F Sævarhagsvikjo, Stord 20.4 (THH), 1 ind. Garen, Eidfjord 25.4 (ATM) og 10 ind. Garen, Eidfjord 4.5 (ATM). Årets eneste høst-trekere på kysten var 1 ind. på Stormark, Fedje 30.9 (FFA) og 1 ind. Herdla, As. 26.11-2.12 (OMO, THA, MFR m.fl.).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Trekkgovinter: Som vanlig er det Herdla, As. som står for de fleste vinterobservasjonene: I perioden 18.1-11.2 ble det sett 1-5 ind. samtidig. 2 ind. var også på Løyning, Odda 18.-28.1 (I.Løyning,RVO). De første vårtrekkerne ankom Herdla med 11 ind. 2.3 (BAN,OMO), og utover våren har vi følgende registreringer: 3 ind. 4.3 (GJE), 40 ind. 25.3 (THA,GJE), 41 ind. 28.3 (DGJ) og 1 ind. 9.4 (THA). Øvrige vår-observasjoner: 5 ind. Finse, Ulvik 11.3 (OHE), 2 N Skogsøy, Øy. 17.3 (JBE), 3 N Hellesøy, Øy. 18.3 (THA,OHE), 2 ind. Skogsøy, Øy. 25.3 (JBE), 10 ind. Sandvin,

Odda 26.3 (IMÅ), 1 ind. Grandane, Voss 30.3 (OHE), 11 ind. Haugo, Voss 30.3 (OHE) 20 ind. Sentrum, Voss 8.-9.4 (SRO) og 35 ind. Gjernesmoen, Voss 17.4 (OHE). De første høsttrekkerne dukket opp 11.10 med 3 ind. Fedje (FFA,ATM,ABR). Deretter fulgte 1 ind. Fedje 4.11 (JDJ m.fl), 1 ind. Herdla, As. 26.11 (THA,MFR) og 1 ind. Gjernesmoen, Voss 17.12 (OHE).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Utvalgte funn: 39 ind. var ved Bjørke, Voss 12.2 (OHE), og 30 ind. var ved Sletten Ridesenter, Be. 3.12 (THA).

Referanser

Falkenberg, F. 2006. Ålefiske med dødelig utgang for rørdrum! [Internett] www.birdlife.no 20. april 2006. Tilgjengelig fra: <http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=36>

Heggøy, O. 2006. Rosenvarsler – ny art for Hordaland! [Internett] www.fuglar.no 21. august 2006. Tilgjengelig fra: <http://fuglar.no/galleri/spesial/20060820.php>

Johannesen, K. 2007. Mongolturteldue på Fedje, Hordaland, 11. oktober 2006. *Feltornitologen* 5: 35.36.

Lislevand, T. 2006. Hordalands første rustsniper. [Internett] www.fuglar.no 26. september 2006. Tilgjengelig fra: <http://fuglar.no/galleri/spesial/20060923.php>

Osland, O. 2007. Herdlaobservasjonar 2006. [Internett] www.fuglar.no 17. mars 2007. Tilgjengelig fra: <http://fuglar.no/lokaliteter/lok/herdla.php>

Olsen & Mjøltnes 2007. Sjeldne fugler i Norge i 2005. *Ornis Norvegica* 30; i trykk.